

GUMBORO FARBIOVET



Vacuna para la prevención de la enfermedad de gumboro
Liofilizado + diluyente



FÓRMULA: Cada dosis contiene:

Cepa Lukert intermedia del virus vivo de Gumboro..... $\geq 10^5$ DIEP 50%
Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES: Aves.

DOSIS DE GUMBORO FARBIOVET:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN		
POLLOS DE ENGORDE REPRODUCTORES PONEDORAS	1 gota equivalente a 1 dosis (0.05 ml)	Intranasal, intraocular, oral o aerosol.		
EN EL AGUA DE BEBIDA				
SEMANA	50 DOSIS	100 DOSIS	500 DOSIS	1 000 DOSIS
2	1.5 l	2.9 l	14.7 l	29.4 l
3	2.2 l	4.4 l	22.1 l	44.1 l
4	2.9 l	5.9 l	29.4 l	58.8 l

Número de dosis = Número de aves. Se aplica la vacuna en el 50% del agua que se va a consumir en un día.

INDICACIONES DE USO: Vacuna indicada para la prevención de la enfermedad de Gumboro o bursitis infecciosa en aves. **GUMBORO FARBIOVET** es efectiva para inmunizar las aves aún en presencia moderada de anticuerpos maternos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intranasal, Intraocular, Oral o Aerosol.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD: Enfermedad infecto contagiosa de origen viral de curso agudo en pollos jóvenes, causada por un virus del género Birnavirus. Afecta a los órganos linfoides, principalmente la bolsa de Fabricio.

Algunas cepas pueden causar hasta 20% de mortalidad en pollos de 3 semanas de edad o más y severa inmunodepresión en aves infectadas en los primeros días de vida que generan secuelas como dermatitis gangrenosa, infección por *E. coli* y fallas en la vacunación.

MECANISMO DE ACCIÓN: Estimula una replicación viral tenue en el animal, pero no provoca una enfermedad clínica, brindando así inmunidad activa y protegiendo a las aves de una exposición natural al virus de Gumboro.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Aplicar la vacuna inmediatamente después de su reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el producto.
- No guardar sobrantes, los restos de la vacuna deben ser desechados. No congelar.
- No vacunar animales enfermos, administrar solo animales sanos.
- Suspender toda medicación o tratamiento del agua de bebida con desinfectantes 48 horas antes de la vacunación.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS:

- En casos extremadamente escasos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.
- No existe un antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

RETIRO: Ninguno.

PRESENTACIONES:

Frasco x 25 dosis
Frasco x 50 dosis
Frasco x 100 dosis
Frasco x 500 dosis
Frasco x 1 000 dosis
Frasco x 2 500 dosis

REGISTRO: 4A-11165-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador