

GUSANERO



Insecticida y cicatrizante
Aerosol



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Clorpirifos	0,71 g
Diclorvos	1,15 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: GUSANERO actúa principalmente:

Contra la miasis cutánea o gusanera causada por larvas de la mosca *Cochliomya hominivorax*.

Protección de las heridas de castración y heridas accidentales.

Efecto cicatrizante con fácil visualización de los animales tratados.

En la cura y prevención de la gusanera del ombligo de los becerros.

Repelente de insectos.

DOSIS: Cantidad suficiente para cubrir la parte afectada y superficies adyacentes. Cada 24 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

CONTRAINDICACIONES: No se debe emplear dentro de un lapso de pocos días de haber utilizado un inhibidor de la colinesterasa (droga, pesticida o químico).

Evitar el contacto con la piel y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS: Producto categoría Ib. Uso externo únicamente. Evite el contacto con la piel, ojos, mucosas del operador, si sucediera lávese con abundante agua y jabón. No absorba e inhale el producto.

Luego de terminado el contenido del envase proceda a eliminar el envase.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

Los estudios realizados en las especies de interés no han demostrado efectos teratogénicos a las dosis usuales. En los cerdos, no se han observado efectos en la capacidad o rendimiento reproductivos o en la sobrevivencia de las crías.

REACCIONES ADVERSAS: Cuando se usa en la forma aprobada, no hay efectos adversos.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: GUSANERO (u otros fenotiacínicos). No deben ser administrados dentro del mes de una desparasitación con organofosforados, ya que sus efectos pueden ser potenciados.

Anticolinesterasas (por ejemplo, neostigmina, fisostigmina y piridostigmina). Evitar su uso junto con organofosforados, ya que las primeras inhiben la colinesterasa.

DMSO. Debido a sus efectos anticolinesterasa, evitar su uso junto con organofosforados.

Morfina. Evitar su uso cuando se emplean organofosforados, ya que pueden inhibir la colinesterasa.

Pamoato (o tartrato) de pirantel. Los efectos adversos se pueden intensificar si se usan en forma concomitante con un organofosforado.

Succinilcolina. Los pacientes que reciben antihelmínticos organofosforados no deben recibir succinilcolina u otros relajantes musculares depolarizantes durante al menos 48 horas.

TIEMPO DE RETIRO: No aplica.

ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del fuego, alejado de alimentos y fármacos. Mantener fuera del alcance de los niños y ani-

males domésticos. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES:

Envases de aluminio x 60 ml.

Envases de aluminio x 250 ml.

Envases de aluminio x 500 ml.

REGISTRO: 3B1-3-2A- 8950-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador