

HEMATOFAR®



Reconstituyente vitaminado + fósforo
Suspensión inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Vitamina B ₁₂ (Cianocobalamina)	0.0011 g
Cobalto acetato	0.050 g
Triptófano	0.250 g
Histidina	0.500 g
Ácido Cítrico	0.500 g
D.L. metionina	1.000 g
Citrato de hierro amoniacal	2.000 g
Cacodilato de sodio	3.000 g
Tiamina clorhidrato	0.500 g
Rivoflavina 5 fosfato	0.200 g
Nicotinamida	5.000 g
Piridoxina clorhidrato	1.000 g
Glicerofosfato de sodio	1.000 g
Agua osmotizada esteril c.s.p.	100 ml

INDICACIONES: En todos los trastornos de la hematopoyesis, anemias de origen alimenticio, infeccioso o parasitario, anemias post-hemorrágicas, anemia de lechones, corderos, terneros.

Tónico y reconstituyente general de los trastornos del metabolismo: debilidad y enflaquecimiento por alimentación deficiente, agotamiento por trabajo excesivo, inapetencia; convalecencia de enfermedades parasitarias infecciosas; intoxicaciones; agotamiento sexual; estimulante del crecimiento y la producción de leche, carne, lana, preparación de animales de deporte y exposición, caída del pelo y otros trastornos de la piel.

Específico en el tratamiento de las enfermedades producidas por protozoarios hemáticos (anaplasmosis, piroplamosis).

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: HEMATOFAR, se administra por vía intramuscular, subcutánea o endovenosa lenta.

Bovinos y equinos: 10 a 12 ml.

Terneros y potrillos: 5 a 10 ml.

Ovejas y cabras: 5 ml.

Cerdos:

2 a 10 kg p/vivo: 1 ml.

10 a 20 kg p/vivo: 2 ml.

20 a 50 kg p/vivo: 5 ml.

Más de 50 kg p/vivo: 10 ml.

Animales menores: 1 ml/5 kg peso.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura ambiente, proteger de la exposición a la luz.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 500 ml.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR