

HEPAROT



Hepatoprotector
Solución oral



FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Silimarina..... 4 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

ESPECIES: Caninos, felinos y aves.

DOSIS DE HEPAROT:

ESPECIE	DOSIS DE REFERENCIA	DOSIS HEPAROT
AVES	200 ppm	Añadir 5 ml de HEPAROT por cada litro de agua de bebida.
CANINOS FELINOS	15 mg/kg	1 ml de HEPAROT por cada 3 kg de peso al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

La duración del tratamiento, dosis y frecuencia de administración del producto pueden ser modificadas a criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES DE USO: **HEPAROT** está indicado en el tratamiento de varias afecciones hepáticas en donde existe un compromiso del hepatocito, como las intoxicaciones por diferentes sustancias, cirrosis, entre otras. Además, posee una acción protectora frente a las aflatoxinas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

FARMACOCINÉTICA: Cuando la silibinina (silibin, silibida) forma un complejo con la fosfatidilcolina, la absorción por vía oral puede aumentar. La droga experimenta una extensa circulación entero-hepática y tiene concentraciones significativamente más elevadas en las células del hígado y la bilis que en el plasma. La mayor parte de la droga se elimina sin cambios por materia fecal, el resto es eliminado con las heces; sólo alrededor del 80% se elimina por orina.

MECANISMO DE ACCIÓN: El silimarín tiene varias acciones farmacológicas que pueden contribuir a sus aparentes efectos en el tratamiento de las enfermedades hepáticas. Inhibe la lípido peroxidasa y la beta-glucuronidasa, y actúa como antioxidante y captador de radicales libres. El silimarín también inhibe los efectos citotóxicos, inflamatorios y apoptóticos del factor de necrosis tumoral. Al parecer, puede alterar la membrana celular externa de los hepatocitos, lo que impide la penetración de la toxina. Se piensa que el silimarín reduce la formación del colágeno hepático y aumenta el contenido de glutatión hepático.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a algunos de los componentes del producto.
- No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS: Es poco probable que las sobredosis causen una morbilidad significativa. Pueden observarse efectos gastrointestinales, los cuales se tratan con la terapia de sostén correspondiente.

RETIRO: No requiere.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta libre.

PRESENTACIONES:

Frasco x 60 ml
Frasco x 1 l
Galón x 3.8 l
Caneca x 20 l

REGISTRO: 1A-11144-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador