

HIDRAT 90



Solución oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Glucosa	2.000 mg
Cloruro de sodio	350 mg
Cloruro de potasio	150 mg
Bicarbonato de sodio	250 mg
Excipientes c.s.p	100 ml
Miliequivalentes por litro:	
Sodio	90 mEq
Potasio	20 mEq
Cloro	80 mEq
Bicarbonato	30 mEq
Glucosa	111 mmol

DOSIFICACIÓN DE HIDRAT 90:

FÓRMULA BÁSICA	
ml = (kg x %) x 1.000	ml: Cantidad de mililitros para administración. kg: Peso del paciente en kilogramos. %: Porcentaje de deshidratación en decimales.
MANTENIMIENTO	
Perros grandes: 20 - 40 ml	Para cada kg de peso en 24 horas.
Perros pequeños: 30 - 60 ml	
El Médico Veterinario puede modificar la dosis de fluidos según su criterio profesional.	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.	

INDICACIONES DE USO: HIDRAT-90 es un suero oral para la deshidratación producida por diarrea y vómito, es además útil para pacientes con anorexia. Aporta con fluidos básicos y con electrolitos como Na⁺, K⁺ y Cl⁻, además de HCO₃ y glucosa como fuente directa de energía.

ESPECIES: Caninos.

ADVERTENCIAS: No debe administrarse a pacientes que se encuentren inconscientes o que no tengan disponible la vía oral. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz a temperatura entre 15 °C y 30 °C. Una vez abierto refrigerar y utilizar en el menor tiempo posible. No congelar.

VENTA: Libre.

CONTRAINDICACIONES: La rehidratación oral es adecuada para corregir la deshidratación leve a moderada. Los fluidos orales no deben administrarse para corregir alteraciones graves como la hipovolemia. Pacientes inconscientes o que tengan suspendida la vía oral.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA: No se conocen efectos adversos durante la gestación y lactancia por administración de suero oral. Considerar antes de la administración la proporción riesgos/beneficios.

Interacciones con otros medicamentos:

Sucralfato: La administración oral de suero oral puede disminuir la eficacia del sucralfato si se administran en forma concurrente.

Medicamentos orales: Debido a que la administración de suero oral puede aumentar o disminuir la velocidad y/o la extensión de la absorción de muchas drogas suministradas por vía oral, se recomienda evitar administrar cualquier droga dentro del lapso de 1-2 horas al uso del suero oral.

Productos con hierro: La administración concomitante de suero oral puede disminuir la absorción; administrar por separado.

Diuréticos: El uso concurrente de suero oral en pacientes que están recibiendo diuréticos perdedores de potasio puede causar alcalosis hipoclorémica.

Antifúngicos Azoles: La administración concomitante de suero oral puede disminuir la absorción; administrar por separado.

PRESENTACIONES:

Frasco x 100 ml

Frasco x 250 ml

REGISTRO: 9A1-18216-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador