

HIERRO 20% FARBIOVET



Antianémico
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Hierro Dextrano 20%..... 100 ml

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento de la anemia causada por deficiencia de hierro principalmente en lechones, reduce la mortalidad de las camadas, mejora el crecimiento y desarrollo con aumento de peso. Con una sola dosis en los lechones se asegura los niveles de hierro en el organismo mejorando la resistencia a las enfermedades.

Se recomienda administrar en cerdas gestantes para evitar la anemia en los lechones recién nacidos. Adyuvante en los animales debilitados por enfermedades hematozoáricas y hemoglobinuria. Indicado además en caso de deficiencia de hierro en bovinos.

DOSIS:

Bovinos:

Adulto: 2,5 a 5 ml.

Ternero: 1,75 a 2,5 ml.

Porcinos: Lechones 0,5 a 1 ml a los 3 días y se repite la dosis a los 7 y 21 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.

CONTRAINDICACIONES: El hierro dextrán está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al mismo, o con cualquier anemia que no sea ferropriva. Tampoco debe emplearse en animales con infecciones renales agudas, ni junto con suplementos de hierro orales.

ADVERTENCIAS: No se debe administrar a pacientes que hayan recibido cloranfenicol, debido a que retarda la absorción del hierro. No se usa hierro dextrano en cerdos adultos, por la coloración de los músculos de jamones.

No usar en casos de hemorragias de tejidos y cavidades corporales, se produce hemosiderosis y causa coloración anormal en los tejidos.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Dosis altas pueden aumentar la incidencia de teratogenicidad y embriotoxicidad. Solo utilizar en animales gestantes en las dosis recomendadas cuando sea necesario.

En la leche se excretan vestigios del producto sin metabolizar.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: El cloranfenicol puede demorar la respuesta a la administración de hierro, evitar su uso en pacientes con anemia por deficiencia de hierro.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

REACCIONES ADVERSAS: Cuando se inyecta IM a cerdos después de las 4 semanas de vida puede inducir coloración del tejido muscular.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Viales x 10 ml

Viales x 20 ml

Viales x 50 ml

Viales x 100 ml

REGISTRO: 7E-13497-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador