

IVERMECTINA® 4%



Antiparasitario potente de amplio espectro
Injectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ivermectina 4.0 g
Excipientes csp. 100 ml

ESPECTRO DE ACCIÓN: Eficaz contra los siguientes parásitos:

Externos:

Nuche: (*Dermatobia hominis*).

Piojo: (*Inognathus*, *haematopinus*, *Damalina*).

Sarna: (*Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei bovis*).

Garrapatas: (*Boophilus microplus*)

Internos:

Gástricos: (formas adultas y larvarias) *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp.

Intestinales: (formas adultas y larvarias) *Bunostomum* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp.

Pulmonares: (formas adultas y larvarias) *Dictyocaulus* spp.

INDICACIONES: La **IVERMECTINA 4.0%** está recomendada para el tratamiento y control de parásitos externos (nuche, ácaros y garrapatas). También para parásitos internos, gastrointestinales y pulmonares.

DOSIS: 1 ml/50 kg de peso corporal.

200 mcg ivermectina/kg de peso, vía exclusivamente subcutánea.

TABLA DE DOSIFICACIÓN DE IVERMECTINA 4.0%:

PESO (kg)	DOSIS (ml)
50	1
51 – 100	2
101 – 150	3
150 – 200	4
201 - 250	5
251 – 300	6
301 – 350	7
351 – 400	8
401 – 450	9
451 – 500	10

TIEMPO DE RETIRO:

Bovinos: En carne 35 días después de su última aplicación.

Cerdos: En carne 18 días después de su aplicación.

PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener en lugar fresco y protegido de la luz.
- No usar el producto por vía intravenosa o vía intramuscular.
- Desechar los envases vacíos.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 500 ml.

REGISTRO: 3A-3B-11610-AGROCALIDAD.

DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR.