

## IVERMECTINA GEL 1.87% CON VITAMINA B<sub>12</sub><sup>®</sup>



**Antiparasitario de amplio espectro**

*Gel oral*



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contienen:

Ivermectina .....	1.87 %
Vitamina B <sub>12</sub> .....	0.10 g

**INDICACIONES:** IVERMECTINA 1.87% GEL está indicado en equinos para el tratamiento y control del parasitismo gastrointestinales, pulmonares, cutáneos incluyendo gastrófilos y estados arteriales de *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*; además controla *Equinus edentatus*, *Triodontophorus* sp., pequeños *Strongylus* (*Cyathostomum* sp., *Cylicocycclus* sp., *Gyalocephalus* sp., *Cylicodontophorus* sp., *Cylicostephanus* sp.), *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, *Trichostrongylus axei*, *Strongylus westeri*, *Habronema muscae*.

**Parásitos cutáneos:** Microfilarias de *Onchocerca* sp., larvas de *Habronema* y *Draschia* sp., otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vía oral únicamente.

**DOSIFICACIÓN:** El producto en jeringa dosificadora está diseñado para facilitar su aplicación sin producir molestias al animal, ni esfuerzos para quien administra el producto.

Administre 200 mcg de ivermectina por kg de peso vivo. 1 g x 100 kg de peso vivo. En la práctica, la jeringa de 6.5 gramos sirve para tratar a un equino de 600 kg de peso vivo.

Depositar la dosis en la parte posterior y encima de la lengua levantando la cabeza del caballo durante unos segundos mientras pasa o deglute el producto.

**FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:** A criterio del Médico Veterinario.

**PRECAUCIONES:**

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Manténgase en sitio fresco, seco y protegido de la luz.

**PRESENTACIÓN:**

Jeringa dosificadora x 6.5 g.

**REGISTRO:** 3A-3B-11972-AGROCALIDAD.

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** INDUFAR ECUADOR.