

IVERSHAMPOO



Antiparasitario de uso externo
Shampoo



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ivermectina.....	1,50 g
Clorhexidina.....	0,44 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Indicado para el control y tratamiento de sarna, pulgas, garrapatas y piojos en caninos y felinos. Además posee un efecto antiséptico gracias a la acción de la clorhexidina.

DOSIS: En caso de parásitos externos vía tópica: 500 ug/kg de peso (0,03 ml de **IVERSHAMPOO**/kg), 2 veces con intervalo de 2 semanas.

Aplicar en forma generosa sobre el pelo y piel del animal completamente mojado, dando masaje vigoroso hasta lograr crear abundante espuma. Dejar actuar por 10 minutos y enjuagar hasta remover toda la espuma. Repetir el procedimiento una vez más y enjuagar el pelaje del animal hasta dejarlo libre de shampoo.

Repetir los tratamientos en base a la prevalencia de parásitos en el lugar y posibilidad de reinfestaciones, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópico.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en caninos jóvenes de menos de tres meses de edad, así como los adultos de la raza Collie y sus cruces. No se debe utilizar en animales que estén en período de producción o lactancia o cercanas al parto, dada la sensibilidad de los neonatos a la ivermectina.

ADVERTENCIAS:

No se recomienda en otras especies que no sean las autorizadas. Usar guantes cuando se trata a un grupo de animales. Evitar el contacto con los ojos y las membranas mucosas.

REACCIONES ADVERSAS: La hipersensibilidad y las reacciones irritativas locales son posibles en pacientes sensibles.

La posibilidad de irritación se incrementa a medida que aumenta la concentración de la clorhexidina; no se recomienda su uso durante un tiempo prolongado, en particular sobre tejido de granulación.

Se recomienda no usar ivermectina en razas susceptibles como el Collie, Pastor de Shetland, Pastor Australiano, etc. Y sus cruces debido a la mutación del gen MDR 1.

La clorhexidina puede causar sordera si entra en contacto con el oído medio.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

La ivermectina es segura para ser usada durante la preñez. Los estudios reproductivos realizados en perros y otras especies no han demostrado efectos adversos en los fetos.

La ivermectina se excreta en la leche en bajas concentraciones; pero poco probable que represente un riesgo significativo para las crías lactantes.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Evitar la administración concurrente con otro ectoparasiticida tópico.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Libre.

PRESENTACIONES:

Cojín x 25 ml.
Frasco x 120 ml.
Frasco x 500 ml.
Frasco x 1 litro.

REGISTRO: 3B-11099-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador