

IVERYL 1%



Antiparasitario
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ivermectina 1.0 g
Excipiente c.s.p. 100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiparasitario.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución inyectable.

INDICACIONES DE USO: IVERYL 1% es eficaz para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en bovinos y porcinos. Previene las gusaneras o miasis del ombligo de terneros recién nacidos y en las heridas producidas por castración. Reduce la contaminación parasitaria de los potreros.

IVERYL 1% es un antiparasitario de amplio espectro eficaz contra parásitos gastrointestinales, pulmonares, moscas, gusaneras, piojos, sarna y garrapatas. Alcanza su máxima eficacia a los 5 días después de aplicado y es recomendado en todos los protocolos de desparasitación de los bovinos y porcinos.

Bovinos: Nemátodos gastrointestinales en sus formas adultas y larvianas (L4 inhibidas y no inhibidas) como: *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Cooperia*, *Trichostrongylus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*.

Pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*.

Parásitos externos: Tupe o nuche (*Dermatobia hominis*); gusaneras (*Hypoderma bovis* y *lineatum*, *Cochliomyia Hominivorax*); piojos (*Linognathus*, *Haematopinus*, *Solenopotes*, *Damalinia*); sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *Bovis*, *Psoroptes communis* var. *Bovis*, *Chorioptes bovis*) y de la garrapata *Boophilus microplus* (eficacia máxima 5 días después del tratamiento).

Porcinos: Parásitos gastrointestinales: *Ascaris suum*, *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides ransomi* (administrando a las cerdas 10 días antes del parto controla efectivamente la transmisión de este parásito a los lechones), *Trichuris suis*.

Pulmonares: *Metastrongylus* spp.

Renales: *Stephanurus dentatus*.

Sarna y piojo: *Sarcoptes scabiei* var. *Suis*, *Haematopinus suis*.

DOSIS SUGERIDA:

Bovinos: 1 ml de IVERYL 1% por cada 50 kg de peso. Puede emplearse la siguiente tabla de dosificación para bovinos.

PESO (kg)	DOSIS (ml)
Desde 50	1
100	2
150	3
200	4
250	5
300	6
600 o más	12

Porcinos: 1 ml de IVERYL 1% por cada 33 kg de peso.

La dosis puede ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o Subcutánea.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70%

de HR.

- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.
- No debe administrarse a vacas cuya leche se destine para consumo humano ni 28 días antes del parto.
- En caninos puede causar reacción especialmente en las razas Collie, Pastor Escocés y sus mestizos.
- No usar en equinos.
- Venta bajo receta médica.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO:

Carne: 35 días.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.
Frasco x 50 ml.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 500 ml.

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 3AB-11740-AGROCALIDAD

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador
Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436