

## IVERYL GOLD



**Antiparasitario**  
Solución inyectable



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:

Ivermectina .....	3.80 g
Excipiente c.s.p. ....	100 ml

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Antiparasitario.

**FORMA FARMACÉUTICA:** Solución inyectable.

**INDICACIONES DE USO:** **IVERYL GOLD** es un antiparasitario de amplia y prolongada acción que proporciona un largo período de protección a los animales. Por su alta concentración, con una dosis única se logra el control eficaz de parásitos externos e internos que afectan a las especies de destino. **IVERYL GOLD** ejerce un control tanto de formas inmaduras como parásitos adultos. **IVERYL GOLD** previene por tiempo más prolongado las gusaneras o miasis del ombligo en terneros recién nacidos y en las heridas producidas por castración. **IVERYL GOLD** reduce la contaminación parasitaria de los potreros.

**Bovinos:** Nematodos gastrointestinales en sus formas adultas y larvarias (L4 inhibidas y no inhibidas) como: *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Cooperia*, *Trichostrongylus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*.

**Pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus*.

**Parásitos externos:** Tupe o nuche (*Dermatobia hominis*); gusaneras (*Hypoderma bovis* y *lineatum*, *Cochliomyia Hominivorax*); piojos (*Linognathus*, *Haematopinus*, *Solenopotes*, *Damalinia*); sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *Bovis*, *Psoroptes communis* var. *Bovis*, *Chorioptes bovis*) y de la garrapata *Boophilus microplus* (eficacia máxima 5 días después del tratamiento).

**Porcinos:** Parásitos gastrointestinales: *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides ransomi* (administrando a las cerdas 10 días antes del parto controla efectivamente la transmisión de este parásito a los lechones), *Trichuris suis*.

**Pulmonares:** *Metastrongylus* spp.

**Renales:** *Stephanurus dentatus*.

**Sarna y piojo:** *Sarcoptes scabiei* var. *Suis*, *Haematopinus suis*.

**DOSIS SUGERIDA:**

**Dosis bovinos:** 1 ml **IVERYL GOLD**/50 kg de peso.

**Dosis cerdos:** 1 ml **IVERYL GOLD**/33 kg de peso.

En caso de ser necesario la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario

**FORMA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea o Intramuscular.

**USO VETERINARIO:**

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

**ADVERTENCIAS:**

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.
- No utilizar en animales cuya leche vaya para consumo humano o fabricación de quesos, ya que interfiere con la coagulación de la caseína.
- No usar dentro de los 42 días antes del parto.

- En caninos puede causar reacción especialmente en las razas Collie, Pastor Escocés y sus mestizos.
- No usar en equinos.
- Venta bajo receta médica.

**MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**TIEMPO DE RETIRO:**

**Carne:** 90 días.

**PRESENTACIONES:**

Frasco x 10 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 500 ml.

**Q.F.R.:** Nelly López de Cobo

**REGISTRO:** 3AB-11739-AGROCALIDAD

**FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:** C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

**Servicio al cliente:** (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436