

IVERYL POUR ON



Antiparasitario
Solución



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	0.5 g
Fipronil	1.0 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiparasitario.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución.

INDICACIONES DE USO: IVERYL POUR ON es una combinación de un endectocida con un eficaz insecticida. Efectivo para el tratamiento y control de parásitos externos como piojos, garrapatas, moscas, etc. Producto con gran absorción.

Ivermectina está indicada para un efectivo tratamiento y control de parásitos internos y externos. Alta tolerancia a sobredosis de hasta 20 veces. La Ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro, eficaz contra una gran variedad de nematodos y ectoparásitos, pero sin acción contra cestodos ni trematodos.

Fipronil es un insecticida de uso externo. Molécula pertenece al grupo de las amidinas fenilpirazoles. Tratamiento y control para eliminar Pulgas *Ctenocephalides* spp.; Piojos: *Trichodectes* spp.; *Felicola* spp.; Garrapatas: *Rhipicephalus* spp. *Ixodes* spp.

IVERYL POUR ON está indicado para el control y tratamiento de parásitos internos y externos de los bovinos.

Endoparásitos: Nematodos gastrointestinales y pulmonares: *Ostertagia* spp., *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Nematodirus* spp., *Strongyloides papillosus* y *Trichuris* spp., *Dictyocaulus* spp.

Ectoparásitos: *Dermatobia hominis* (nuche o tupe), *Hypoderma* spp., *Haematobia irritans* (Mosca del cuerno).

Ácaros de la sarna: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*.

Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Damalinea bovis*, *Solenopotes capillatus*.

Indicado para ser usado en: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, cuyes, conejos y aves.

DOSIS SUGERIDA:

Bovinos: 10 ml por cada 100 kg de peso vivo.

PESO (kg)	DOSIS IVERYL POUR ON (ml)
10	1
100	10
200	20
400	40

Aves: 12 gotas por animal.

Cuyes y conejos: 10 a 12 gotas.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

Bovinos: Aplique de manera continua y uniforme sobre el lomo del animal desde la cruz hasta la base de la cola, sin ejercer demasiada presión en el frasco. Cada pasada sobre el lomo de un animal rocía en promedio 15 ml, por lo que se recomienda realizar dos a tres pasadas sobre el lomo en animales grandes y una sola pasada en animales pequeños.

Aves: Aplicar en la zona de la cloaca.

Cuyes y conejos: Sobre la piel (no en el pelo), aplicado desde atrás de la cabeza hasta la base de la cola.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.
- Usar guantes para administrar el producto.
- No utilizar en animales cuya leche se destine para el consumo humano y fabricación de quesos.
- Venta libre.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: No usar.

Carne: 100 días.

PRESENTACIONES:

Gotero x 30 ml.

Gotero x 100 ml.

Frasco x 1 000 ml.

Q.F.R.: Nelly de Cobo

REGISTRO: 3AB-11915-AGROCALIDAD

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436