

KAO-PEG



Antidiarreico
Polvo



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Oxitetraciclina HCl.....	12,5 g
Caolín.....	38,8 g
Pectina.....	5,0 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento y control de diarreas, infecciones gastrointestinales causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas.

DOSIFICACIÓN DE KAO-PEG:

ESPECIE	DOSIS
BOVINOS	Dosis referencial Oxitetraciclina 22 mg/kg de peso
	10 g de KAO-PEG por cada 55 kg de peso. 100 g de KAO-PEG por cada 550 kg de peso.
	Cada 24 horas durante 7-14 días o según criterio del Médico Veterinario.
PORCINOS	Dosis referencial Oxitetraciclina 20 mg/kg de peso
	10 g de KAO-PEG por cada 60 kg de peso.
	Cada 24 horas durante 3 días o según criterio del Médico Veterinario.
Disolver la dosis requerida en cantidad suficiente de agua de bebida.	

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: En agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES: Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Su uso en hembras gestantes puede inducir coloración anormal en las piezas dentarias de neonatos. La oxitetraciclina es químicamente incompatible con amikacina y otros aminoglucósidos, ampicilina sódica, glucocorticoides, penicilina G, etc., por lo tanto no debe combinarse. Puede producirse estreñimiento en pacientes deshidratados. Esporádicamente puede presentarse náuseas, vómito y dolor abdominal.

ADVERTENCIAS: Utilizar soluciones frescas y desechar los sobrantes. No se recomienda en otra especie que no sea la indicada.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Las tetraciclinas son excretadas en la leche pero como gran parte de la droga estará unida al calcio lácteo, es poco probable que sea importante para las crías en lactancia.

REACCIONES ADVERSAS: En animales jóvenes puede causar la coloración amarilla, marrón o gris de los huesos y los dientes. Altas dosis y tratamientos prolongados puede demorar el desarrollo de los huesos y la cicatrización. El tratamiento prolongado puede producir un sobrecrecimiento de bacterias u hongos no susceptibles.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No administrar con Betalactámicos o Aminoglucósidos.

SOBREDOSIS: Por lo general, las tetraciclinas son bien toleradas después de una sobredosis aguda. Si el paciente desarrolla

vómitos o diarreas graves, es necesario controlar el equilibrio hídrico-electrolítico y hacer los reemplazos que sean necesarios.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 21 días. Leche: 2 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Sobre x 10 g

Sobre x 100 g

REGISTRO: 5G1-10860-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador