

KETAMIN® 10% INYECTABLE



Anestésico
Inyectable



COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada ml de la inyección contiene:

Ingredientes activos:

Ketamine (como hidrocloreto) 100.0 mg

Ingredientes inactivos:

Benzethonium cloruro..... 0.1 mg/ml

Agua para inyecciones c.s.p..... 1 ml

KETAMIN 10% Inyectable, se utiliza para la inducción de la anestesia de corto plazo en exámenes de animales agitados, procedimientos radiográficos y cambios de vendajes de heridas. En combinación con atropina y xilacina, se utiliza en los procedimientos quirúrgicos (ovarectomía, castración, cesárea, cirugía de la mandíbula, extracciones dentales, limpiezas dentales, cirugías oculares, nasales y de los oídos, abertura de abscesos).

DOSIS:

PARA ADMINISTRACIÓN INTRAMUSCULAR:

Caninos: 5 - 15 mg/k.p.v. sola o 6 - 10 mg/k.p.v. combinada con 1 - 2 mg/k.p.v. de xylazina y 0.05 - 0.1 mg/k.p.v. de atropina.

Felinos: 10 - 20 mg/k.p.v. sola u 8 - 20 mg/k.p.v. combinada con 1 - 2 mg/k.p.v. de xylazina y 0.005 - 0.1 mg/k.p.v. de atropina (subcutánea).

Vacunos: 2 - 5 mg/k.p.v. (Intramuscular).

Caprinos: 10 mg/k.p.v. combinada con 0.22 mg de xylazina/k.p.v. (Intramuscular).

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS: Si se administra según la dosificación recomendada y se siguen las precauciones especiales dadas, no hay riesgo de sobredosis. La administración repetida de ketamina no lleva al desarrollo de intolerancia o complicaciones importantes.

CONTRAINDICACIONES:

- Descompensación cardíaca, cirugía intracraneal o trauma del cerebelo, glaucoma, insuficiencia renal y del hígado.
- No debe administrarse a animales preñados o durante la lactancia.
- No administrar junto a inhibidores de la colinesterasa.
- El producto puede perder su calidad debido a: Mantenimiento prolongado ante la luz solar directa, altas temperaturas, envases abiertos, productos caducados y mal manejo del producto.
- Conservar en lugares secos, oscuros, protegidos del calor, la humedad, lejos del alcance de los niños, en su envase original y bien cerrado a temperatura ambiental entre 15° y 25° C.
- El envase pinchado tiene una duración de 30 días si se almacena entre 8° y 15° C y en la oscuridad.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 25 ml.

REGISTRO: 8A1-8563-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: DUTCH FARM INT. - HOLANDA

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035