

KILTIX® COLLAR



**Collar antiparasitario para perros grandes,
medianos y pequeños**
Collar cutáneo



COMPOSICIÓN: Cada 10 g de collar contiene:

Propoxur	1 g
Flumetrin	0.225 g
Excipientes c.s.p.	10 g

INDICACIONES: KILTIX® COLLAR collar está indicado en perros para el control de infestaciones por garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) y pulgas (*Ctenocephalides canis/felis*). La eficacia contra garrapatas y pulgas dura hasta 4 meses.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Propoxur es un ectoparasitocida de tipo ácido carbamínico que inhibe la enzima colinesterasa provocando la parálisis y muerte de las garrapatas y pulgas. Sin embargo, la toxicidad para los mamíferos es baja.

Flumetrin es un ectoparasitocida del grupo de los piretroides sintéticos que tienen una acción neurotóxica sobre la membrana celular del nervio de los parásitos. Después de un estado inicial de excitación, los parásitos sufren trastornos de coordinación, parálisis y finalmente la muerte.

Flumetrin presenta una notable actividad garrapaticida.

Los ingredientes activos son liberados continuamente de la formulación del collar. Las concentraciones insecticidas de ambos ingredientes activos están presentes en el pelaje del perro durante todo el periodo de eficacia.

La asociación de Flumetrin con Propoxur intensifica significativamente la eficacia contra garrapatas y pulgas en comparación con cada tratamiento individual. Esto también queda demostrado por la extensión considerable en el periodo de eficacia.

CONTRAINDICACIONES: KILTIX® COLLAR no debe ser empleado en perros con lesiones cutáneas ni en perros enfermos o convalecientes.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Ocasionalmente puede observarse ligero picor en los primeros días, tras la colocación del collar.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Uso Externo:

Los perros deben usar un collar correspondiente a su tamaño así:

Perros Pequeños (3-10 kg de peso) collar de 35 cm.

Perros Medianos (11 - 20 kg de peso) collar de 48 cm.

Perros Grandes (a partir de 21 kg de peso) collar de 66 cm.

Extraer el collar de la bolsa protectora y quitar las tiras de plástico de la parte interna del collar para desenrollarlo.

Colocar el collar apretarlo alrededor del cuello del perro y pasar el extremo del mismo a través de la hebilla.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO DE KILTIX® COLLAR:



Los propietarios deben controlar la piel en la zona del collar durante los primeros días para asegurarse que éste no esté demasiado apretado (entre el collar y el cuello debe dejarse un espacio de 2 dedos). El collar debe ser llevado por el perro continuamente. No requiere que el perro esté en reposo o movimiento. El efecto con-

tra las garrapatas y las pulgas empieza dentro de las primeras 24 horas después de la colocación del collar.

PRECAUCIONES GENERALES: NO USAR EN GATOS.

- Únicamente para USO VETERINARIO.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.
- Los niños deben evitar el contacto con animales que lleven el collar.
- Evite que el collar sea llevado a la boca en particular los niños.
- Use guantes protectores para la manipulación del producto.
- Evite el contacto con ojos, piel y boca.
- En caso de contacto con piel y ojos lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto.

PRECAUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE: Este producto es altamente tóxico para los organismos acuáticos, las aves y las abejas. No permita que los perros que llevan el collar naden en cuerpos de agua. Este producto puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No reutilizar los envases vacíos, deshacerse de los envases vacíos y sus residuos de conformidad con la ley de gestión integral de residuos peligrosos.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar en un lugar fresco y seco protegido de la luz directa del sol a una temperatura entre 15°C y 30 °C. Mantener lejos de los alimentos, piensos y bebidas. Mantenga el producto en su empaque original bien cerrado hasta el momento de su uso. Mantenga el producto lejos del fuego y del calor excesivo.

EFFECTOS ADVERSOS: En animales ocasionalmente puede observarse un ligero picor en los primeros días tras la aplicación del collar. En casos muy raros personas sensibles pueden manifestar reacciones alérgicas cutáneas posteriores a la manipulación del producto. Personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto con el producto veterinario.

MANEJO EN CASOS DE INTOXICACIÓN: Cuando se presentan síntomas de intoxicación por Carbamatos (Propoxur), usar Sulfato de Atropina al 0,1%.

Dosis para humanos: 2-4 mg (equivalentes a 2 - 4 ml) por vía IV lenta cada 5 a 10 minutos hasta lograr signos de atropinización.

Dosis para animales: 0,25 mg/kg de peso vivo (equivalente a 2.5 ml por cada 10 kg de peso vivo). Aplicar ¼ parte de la dosis vía IV lenta y el restante vía IM o SC. Observar el animal permanentemente y de acuerdo a la sintomatología repetir el tratamiento cada 6 a 12 horas. Para síntomas asociados a efectos tóxicos de piretroides (Flumetrin) no hay antídoto específico, por lo tanto realizar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de la etiqueta.

En caso de intoxicación animal llame al Médico Veterinario.

En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente, favor llamar a Cisproquim: Ecuador: 1800-59-3005.

MATERIAL DE EMPAQUE: Caja de cartón con 1 sachet de plástico transparente.

CLASIFICACIÓN TÓXICOLOGICA: Medianamente Tóxico (Categoría III) Cuidado (Azul).

VIDA ÚTIL: 60 meses

PRESENTACIONES:

Caja x 1 collar x 45 g para perros grandes (66 cm)

Caja x 1 collar x 30.2 g para perros medianos (48 cm)

Caja x 1 collar x 12.5 g para perros pequeños (35cm)

REGISTRO: 3B1-3-11654-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: BAYER KVP PHARMA - ALEMANIA

DISTRIBUIDO POR: ELANCO