

## LEGXUS



**Antiparasitario interno**  
*Solución oral*



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:

Levamisol ..... 3,2 g  
Vehículo c.s.p ..... 100 ml

**INDICACIONES:** Está indicado para el tratamiento de gusanos pulmonares y gastrointestinales, en particular contra parásitos adultos en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

**DOSIS REFERENCIAL:** 8 mg/kg P.V.

**Bovinos:** 30 ml por cada 120 kg de peso vivo.

**Porcinos, Ovinos, Caprinos:** 15 ml por cada 60 kg de peso vivo.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**CONTRAINDICACIONES:** Está contraindicado en animales lactantes. Debe usarse con precaución en animales muy débiles o con deficiencia renal o hepática y evitarse en bovinos estresados por vacunación, descorné o castración.

**ADVERTENCIAS:** No administrar en animales con lesión hepática. No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. No existe un antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los efectos adversos en los bovinos pueden incluir hociro con espuma o hipersalivación, excitación o temblores, lamido del labio y sacudidas cefálicas. Por lo general, estos efectos se observan con dosis más altas que las recomendadas, o si el levamisol es usado en forma concomitante con organofosforados. En general, los signos ceden en unas 2 horas. En lo ovinos, el levamisol puede causar una excitabilidad transitoria en algunos animales después de la administración. En cabras, puede causar depresión, hiperestesia y salivación. En porcinos, el levamisol puede causar salivación o presencia de espuma en el hociro. Los cerdos infectados con gusanos pulmonares pueden manifestar tos o vómito.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:** Compuestos similares a la nicotina (ejemplo pirantel, morantel, dietilcarbamazina) podría aumentar los efectos tóxicos del levamisol.

**TIEMPO DE RETIRO:**

**Bovinos:** 2 días.

**Ovinos y Porcinos:** 3 días.

No se recomienda administrar en ganado lechero.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**PRESENTACIONES:**

Sachet x 30 ml, (caja x 55 unidades).

**REGISTRO:** 3A1-10804-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador