

LEVAFAR 3.2 %[®]



Antiparasitario de amplio espectro
Vía oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Clorhidrato de Levamisol..... 3.2 g
Excipientes c.s.p..... 100 ml

DOSIS:

Bovinos adultos: 2 cojines x 30 ml.

Bovinos jóvenes: 1 cojín x 30 ml.

Porcinos, ovinos: 1 cojín x 30 ml.

Disolver 1 cojín de 30 ml en 10 litros de agua para 100 a 125 aves de 1 kilo de peso vivo promedio.

INDICACIONES: LEVAFAR 3.2% es efectivo para eliminar los parásitos gastrointestinales y pulmonares en bovinos, ovinos y porcinos.

CONTRAINDICACIONES: No usar en equinos. Evitar el uso de Levamisol junto con cloranfenicol, debido a que puede ocasionar la muerte del animal. No administrar en animales debilitados, con disfunciones hepáticas y/o renales. Administrar en la dosis y especies recomendadas.

TIEMPO DE RETIRO:

Carne: 3 días antes del sacrificio.

Leche: 24 horas.

ALMACENAMIENTO:

Humedad relativa 40-70 %.

Mantener en un lugar fresco y protegido de la luz entre 8° y 25° C.

RECOMENDACIONES:

Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Cojín x 30 ml.

REGISTRO: 3A4-13905-AGROCALIDAD.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR