

LIDOCAÍNA AL 2 %



Anestésico local

Infiltración o anestesia epidural



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Lidocaína clorhidrato 2 g
Excipientes c.s.p 100 ml

GENERALIDADES: Solución anestésica local.

PROPIEDADES: Es un anestésico local que bloquea la conducción nerviosa, previniendo el inicio y la propagación de las señales de dolor.

INDICACIONES: Es el fármaco de elección para anestesia epidural, anestésico local de infiltración.

Para los caballos de carrera se utiliza como técnica de anestesia perineural, en el diagnóstico de enfermedades articulares.

Indicado para bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Infiltración o anestesia epidural.

DOSIS DE LIDOCAÍNA AL 2 %:

ESPECIES	ANESTESIA EPIDURAL CAUDAL	BLOQUEO NERVIOSO PARAVERTEBRAL	BLOQUEO NERVIOS PERIFÉRICOS	INFILTRACIÓN
BOVINOS	5 – 15 ml	7 ml	5 – 20 ml	Según criterio profesional.
OVINOS Y CAPRINOS	2 – 8 ml	4 ml	5-7 ml	
PORCINOS	3 – 10 ml	4 ml	5-7 ml	
EQUINOS	6 – 10 ml	6 ml	10 ml	
CANINOS	0,5 – 2 ml	1ml	2 ml	

TIEMPO DE RETIRO: No tiene.

PRECAUCIONES:

- No inyectar por vía intravenosa.
- No exceder la dosis recomendada.
- No es compatible con dopamina, ampicilina sódica.
- Mantener en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Una vez abierto el frasco, utilizar todo el contenido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine el envase luego de utilizar el producto.
- Almacenar en sitio fresco, seco, protegido de la de la luz y humedad, a menos de 30 ° C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 100 ml

REGISTRO: 8A1 – 11066-AGROCALIDAD.

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.