

MAL BOBO



Bacterina para el control neumoenteritis
Suspensión inyectable



FÓRMULA: Cada dosis ml contiene:

Pasteurella multocida $\geq 1 \times 10^8$ UFC
Pasteurella haemolytica $\geq 1 \times 10^8$ UFC
E. coli $\geq 1 \times 10^8$ UFC
Salmonella typhimurium $\geq 1 \times 10^8$ UFC
Excipientes c.s.p. 1 ml

ESPECIES: Bovinos.

DOSIS DE MAL BOBO:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
VACAS PREÑADAS	5 ml	Intramuscular o subcutánea.
TERNEROS en la primera hasta los 4 meses	5 ml	Intramuscular o subcutánea.
VACUNACIÓN:		
Recomendación: En caso de terneros se puede repetir el proceso a los 15 días.		

INDICACIONES DE USO: MAL BOBO es una bacterina indicada para el control de la neumoenteritis en terneros recién nacidos y para la creación de anticuerpos maternos en vacas preñadas 30 días antes del parto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o Intramuscular.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD: La neumoenteritis es una afección que se produce en los terneros a los pocos días de su nacimiento. Se la denomina también como peste boba, neumoenteritis, diarrea blanca, diarrea colibacilar o salmonelosis. La patogenia de la enfermedad está centrada en la pérdida de líquidos y electrolitos.

LOS PRINCIPALES SIGNOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD SON: Problemas respiratorios, diarrea blanca, en ocasiones se presenta onfaloflebitis, deterioro en la condición corporal, deshidratación e incluso la muerte.

MECANISMO DE ACCIÓN: Estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, previniendo la colonización de las bacterias: *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *E. coli* y *Salmonella typhimurium*. Evitando así la presentación neumoenteritis en terneros.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- No guardar sobrantes. Los restos de la vacuna deben ser desechados, de preferencia incinerados.
- No congelar.
- Vacunar sólo animales sanos.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS: En casos esporádicos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si sucediera administrar inmediatamente epinefrina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

RETIRO: Ninguno.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 5 ml (1 dosis)

REGISTRO: 4C-8510-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador