

MAREK FARBIOVET



Vacuna para la prevención de la Enfermedad de Marek
Liofilizado + diluyente



FÓRMULA: Cada dosis contiene:

Cepa HVT-1 intermedia del virus vivo de Marek ≥ 1 500 PFU
Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES: Aves.

DOSIS DE MAREK FARBIOVET:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
POLLITOS 1 día de edad	0.2 ml (Equivale a 1 dosis)	Subcutánea en el cuello/intra- muscular en la pierna.

INDICACIONES DE USO: Vacuna indicada para la prevención de la enfermedad de Marek en aves. **MAREK FARBIOVET** es efectiva para inmunizar las aves aún en presencia moderada de anticuerpos maternos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o Intramuscular.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD: La enfermedad de Marek (EM) es una enfermedad contagiosa viral neoplásica que se caracteriza por la presencia de linfomas de las células T e infiltraciones en nervios y órganos por linfocitos.

EXISTEN TRES PRESENTACIONES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD: Nerviosa (parálisis flácida generalmente unilateral de las patas o alas), Visceral (aparece diarrea en algunos casos; presencia de tumores en diferentes órganos, sobre todo hígado, proventrículo y bazo) y Cuello flácido (aparece una parálisis flácida transitoria en el cuello de las aves).

MECANISMO DE ACCIÓN: Estimula una replicación viral tenue en el animal, pero no provoca una enfermedad clínica, brindado así inmunidad activa y protegiendo a las aves de una exposición natural al virus de Marek.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Aplicar la vacuna inmediatamente después de su reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el producto. No guardar sobran-tes, los restos de la vacuna deben ser desechados. No congelar.
- No vacunar animales enfermos, administrar solo animales sanos.
- El uso de agujas, jeringas y tapones no estériles pueden resultar en la formación de abscesos y decomiso de las aves.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS:

- En casos extremadamente escasos, puede presentarse una re-acción alérgica a la aplicación de la vacuna.
- No existe un antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

RETIRO: Ninguno.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 5 dosis

REGISTRO: 4A-12118-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246