

MASTIBROKE LACTACIÓN



Antimastítico
Suspensión intramamaria



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Cefalexina Sódica.....	4,0 g
Flunixin Meglumine.....	1,0 g
Excipientes c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: MASTIBROKE LACTACIÓN formulado a base de Cefalexina está indicado para el tratamiento de la mastitis clínica y subclínica durante el período de lactación, causado por *Staphylococcus* spp. (Incluyendo cepas penicilinas resistentes), *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Proteus* spp., *Micrococcus* spp., *Moraxella*, *Actinobacillus ligneressii*, *Actinomyces bovis*, *Haemophilus* spp. *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Clostridium* spp., *Salmonella* spp., *Fusobacterium* spp., *Peptostreptococcus* spp., *Peptococcus* spp. Además el flunixin meglumine es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroide útil en todo tipo de Mastitis.

DOSIS: 1 jeringuilla (5 ml) por cuarto: Equivale a 200 mg de Cefalexina y 50 mg de flunixin Meglumine. Intramamaria. Según el caso, hacer una segunda aplicación, a las 24 horas, a criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.

ADVERTENCIAS:

- No se conoce efectos adversos en bovinos.
- No mezclar con otros productos ya que puede disminuir la eficacia.
- Antes de su administración se recomienda realizar una limpieza previa, una desinfección de los pezones y un ordeño profundo, después proceder a aplicar el contenido de una jeringa en cada cuarto afectado.
- En caso de contacto con ojos y/o manos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y avisar al Médico.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

Los estudios de laboratorio efectuados en animales no han demostrado evidencias de efectos teratogénicos. Los estudios de campo efectuados en vacas lecheras no han demostrado evidencias de efectos teratogénicos, tóxicos para el feto, ni tóxicos para la madre. El producto puede usarse en vacas gestantes.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Debe evitarse la combinación con antimicrobianos bacteriostáticos. En caso de resistencia a la Cefalexina, puede aparecer resistencia cruzada con otras cefalosporinas. Es conocida la resistencia unidireccional con estreptomycin.

TIEMPO DE RETIRO: Leche: 3 días Carne: 7 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Caja de 4 jeringas x 5 ml
Balde x 80 + 8 Jeringas

REGISTRO: 2C2-12014-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador