

MASTIBROKE SECADO



Antibiótico antimastítico
Suspensión intramamaria



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Cefalexina Sódica.....	5,0 g
Penicilina Procaínica.....	6.000.000 UI
Dihidroestreptomicina Sulfato.....	2,0 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: MASTIBROKE SECADO está indicado para la prevención y tratamiento de la mastitis causadas por *Staphylococcus* spp. (incluyendo cepas penicilina resistentes), *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Proteus* spp., *Micrococcus* spp., *Moraxella* spp., *Actinobacillus lignieresii*, *Actinomyces bovis*, *Haemophilus* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Clostridium* spp., *Salmonella* spp., *Fusobacterium* spp., *Peptostreptococcus* spp., *Peptococcus* spp., durante el periodo seco de las vacas y especialmente, de aquellas que durante su curva de lactancia puedan haber padecido o estén padeciendo un proceso de mastitis subclínica. Evita las pérdidas de leche en las siguientes lactancias por infecciones preexistentes.

DOSIS: 1 jeringuilla (5 ml) por cuarto: equivale a 250 mg de Cefalexina, 300.000 UI de Penicilina Procaínica y 100 mg de Dihidroestreptomicina sulfato. Intramamaria. Según el caso, hacer una segunda aplicación, a las 24 horas, a criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS: No se conoce efectos adversos en bovinos. No mezclar con otros productos ya que puede disminuir la eficacia. En caso de contacto con ojos y/o manos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y avisar al Médico.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Los estudios de laboratorios efectuados en animales no han demostrado evidencias de efectos teratogénicos. Los estudios de campo efectuados en vacas lecheras no han demostrado evidencias de efectos teratogénicos, tóxicos para el feto, ni tóxicos para la madre. El producto puede usarse en vacas gestantes.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Debe evitarse la combinación con antimicrobianos bacteriostáticos. En caso de resistencia a la Cefalexina, puede aparecer resistencia cruzada con otras cefalosporinas. Es conocida la resistencia unidireccional con estreptomicina.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: 36 horas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Caja de 4 jeringas x 5 ml
Balde x 80 + 8 Jeringas

REGISTRO: 2C2-11744-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246