

MASTIJET FORTE®



Tratamiento intramamario de la mastitis durante la lactancia *Inyector*



COMPOSICIÓN:

Tetraciclina HCl	200 mg
Neomicina Base	250 mg
Bacitracina	2 000 UI
Prednisolona	10 mg

INDICACIONES: Se recomienda para el tratamiento de mastitis causada por Bacterias Gram-positivas y/o Gram-negativas en animales en lactancia. Si la mastitis es acompañada de una enfermedad sistémica, se recomienda un tratamiento parenteral, además del tratamiento intramamario.

DIRECCIONES DE USO:

1. Ordeñar a fondo.
2. Limpiar los pezones cuidadosamente.
3. Destapar la jeringa, insertar la punta en el canal del cuarto e inyectar el contenido total de la jeringa.
4. Retirar la jeringa, tomar firmemente el final del pezón y masajear el cuarto.
5. Cuando sea necesario se deberá repetir el tratamiento a intervalos de 24 horas.

PRECAUCIONES:

1. Descartar toda la leche durante el tratamiento.
2. Descartar la leche de los cuartos tratados, durante los seis primeros ordeños posteriores al último tratamiento.
3. Descartar la leche de los cuartos no tratados, de un ordeño, después del último tratamiento.

PERIODO DE RETIRO: La leche de los cuartos tratados no deberá consumirse durante el tratamiento ni durante las 96 horas después de la última aplicación.

La leche de los cuartos no tratados deberá ser desechada durante el tratamiento y por una ordeña después de éste.

Carne y vísceras: 14 días.

PRESENTACIÓN:

Caja de 20 inyectores x 8 g cada uno.

REGISTRO: 2C2-7273-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: INTERVET INTERNATIONAL.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666