

MASTIKURE 100



Antibiótico

Suspensión intramamaria



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Cloxacilina	8.0 g
Bromhexina	1.0 g
Ác. Acetil Salicílico	2.0 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antibiótico.

FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión intramamaria.

INDICACIONES DE USO: MASTIKURE 100, suspensión para aplicación intramamaria, con actividad comprobada para el tratamiento de mastitis en vacas, ovejas y cabras.

En vacas, ovejas y cabras para el tratamiento de mastitis clínica y subclínica, causadas por bacterias Gram-positivas y/o Gram-negativas. Además del tratamiento intramamario con **MASTIKURE 100**, se recomienda un tratamiento sistémico con CEFALIM.

DOSIS SUGERIDA:

Bovinos: 1 inyector de **MASTIKURE 100** por cuarto cada 12 – 24 horas.

Ovinos – Caprinos: ½ inyector de **MASTIKURE 100** por cuarto cada 12 – 24 horas.

La duración y frecuencia del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.

Antes de iniciar el tratamiento:

- Ordeñar a fondo.
- Limpiar y desinfectar los pezones con un sellador a base de yodo.
- Destapar el inyector de **MASTIKURE 100** e insertar la cánula intramamaria en el pezón del cuarto afectado y depositar todo contenido.
- Retirar el inyector, tomar firmemente el final del pezón y masajear el cuarto para difundir el medicamento.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.
- La leche producida durante el tratamiento y hasta 72 horas después de finalizado el mismo, no es apta para el consumo humano.
- Descartar la leche de los cuartos tratados.
- Venta bajo receta médica.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: 72 horas.

PRESENTACIÓN:

Jeringa para infusión intramamaria x 10 ml

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 2C3-4-6E-9848-AGROCALIDAD

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436