

MASTIKURE SECADO



Antibiótico (intramamario)
Suspensión



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Cloxacilina	5.0 g
Sulfato de dihidroestreptomicina	2.5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antibiótico (intramamario).

FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión.

INDICACIONES DE USO: MASTIKURE SECADO está indicado para la utilización en bovinos y caprinos en el momento del secado de la leche al final del ciclo de producción; esto es inmediatamente después de la última ordeña con el fin de prevenir la mastitis post parto e impedir que las mastitis subclínicas evolucionen a mastitis clínicas.

Las penicilinas actúan esencialmente contra cocos y *bacilos* gram positivos. Igualmente es activo contra cocos gram negativos como la *Neisseria* (*meningococos* y el *gonococo*). Están indicados en mastitis por *Streptococo* sp. y mastitis por *Staphilococo* productor y no productor de penicilinasa. Para el tratamiento profiláctico de la mastitis en vacas durante el periodo seco por su contenido de Cloxacilina Benzatínica, permite por más tiempo la presencia del producto en la glándula mamaria por ser de muy baja solubilidad y por tanto lenta absorción.

MASTIKURE SECADO evita la proliferación de bacterias en la ubre ya que su formulación permite que el producto se distribuya hacia todo el tejido mamario.

La consistencia y excipientes usados en el **MASTIKURE SECADO** permiten que parte del producto se aloje en la cisterna del pezón creando un efecto de barrera dentro de este e impidiendo el ingreso de microorganismos a través de su orificio y la salida del producto por acción mecánica; esto elimina la necesidad de realizar una infusión con un sellador intramamario.

DOSIS SUGERIDA:

Bovinos: 1 jeringa por cuarto cada 12 – 24 horas.

Ovinos – Caprinos: ½ jeringa por cuarto cada 12 – 24 horas.

La duración y frecuencia del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.

Antes de iniciar el tratamiento:

- Ordeñar a fondo.
- Limpiar y desinfectar los pezones con un sellador a base de yodo.
- Destapar el inyector de **MASTIKURE SECADO** e insertar la cánula intramamaria en el pezón del cuarto y depositar todo contenido.
- Retirar el inyector, tomar firmemente el final del pezón y masajear el cuarto para difundir el medicamento.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, de 4°C a 32°C y 70% HR
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.

- Descartar la leche de los cuartos tratados.
- Venta bajo receta médica.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: 12 días, no usar la leche para consumo humano.

Carne: 30 días.

PRESENTACIÓN:

Jeringa x 10 ml.

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 2C2-11698-AGROCALIDAD

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436