

MAXIBAN™

Ionóforo potenciado (Narasina + Nicarbazina) para el control de coccidiosis en aves

Oral

**COMPOSICIÓN:****INGREDIENTES ACTIVOS**

Narasina	80 g
Nicarbazina	80 g
Excipientes c.s.p.	1 000 g

INDICACIONES: En el control de la coccidiosis causada por *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. máxima*, *E. mivati*, *E. necatrix* y *E. tenella*, en pollos.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO: Adicionar de 500 a 625 gramos de **MAXIBAN™** por cada 1 000 kg de alimento completo para proveer una concentración final de 80 ppm a 100 ppm.

MAXIBAN™ debe ser uniformemente mezclado con una pequeña cantidad de alimento (20 a 50 kg) antes de incorporarlo al volumen total de alimento.

INSTRUCCIONES PARA SU ADMINISTRACION: Se recomienda que **MAXIBAN™** sea usado durante los primeros 14 a 28 días en la primera etapa de un programa dual (**MAXIBAN™** - Monteban™) o (**MAXIBAN™** -Elancoban™) a una concentración de 80 a 100 ppm total de anticoccidial (40: 40 o 50: 50 ppm narasina + nicarbazina), dependiendo del reto de coccidiosis presente.

IMPORTANTE: Debe ser mezclado cuidadosamente en el alimento antes de usarse.

CONTRAINDICACIONES: Aves consumiendo **MAXIBAN™** no deben ser tratadas con productos que contengan Tiamulina. Puede ocurrir una grave depresión del crecimiento.

PRECAUCIONES: No administrar el alimento con **MAXIBAN™** a ponedoras, pavos o equinos, la ingestión de la narasina en los equinos puede ser fatal.

Pollos medicados con nicarbazina pueden mostrar reducción en la tolerancia al calor, cuando son expuestos a alta temperatura y humedad. Proveer agua en cantidades suficientes y buena ventilación durante estos períodos calóricos.

MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
VENTA CON RECETA PROFESIONAL.

PERIODO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

Cuando se mezcle y transporte **MAXIBAN™** se debe usar ropa protectora, guantes impermeables y máscara antipolvo.

Si ocurre contacto accidental con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua. Los operadores tendrán que lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manejar el producto.

ALMACENAMIENTO: Almacene en sitio fresco y seco. Manténgase a una temperatura inferior a 25°C.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO DESPUÉS QUE SE HAYA LLEGADO A LA FECHA DE EXPIRACIÓN IMPRESA EN EL SACO.

PRESENTACIÓN:

Saco x 25 kg.

REGISTRO: 3A-2944-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO