

## MEGACALCIO



**Reconstituyente**  
Solución inyectable



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:

Levulinato de Calcio .....	3,8 g
Gluconato de Calcio .....	16,1 g
Cloruro de Magnesio .....	1,6 g
Fosforilcolamina .....	0,5 g
Dextrosa .....	5,0 g
Vehículo c.s.p .....	100 ml

**INDICACIONES:** Está indicado como suplemento de calcio, fósforo, magnesio y dextrosa para la fiebre de leche, hipocalcemia, raquitismo, adyuvante en los casos de cetosis, intoxicaciones y en animales convalecientes.

**DOSIS:**

**Bovinos:** 200-300 ml intravenosa lenta.

**Ovinos:** 25-50 ml intravenosa lenta.

**Porcinos:** 50-100 ml subcutánea.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intravenosa lenta y Subcutánea. La dosis recomendada es de 0.5 a 0.6 ml por kg de peso corporal.

**CONTRAINDICACIONES:** Contraindicado en animales con cálculos renales, fibrilación ventricular e hipercalemia.

**ADVERTENCIAS:** La aplicación intravenosa muy rápida puede causar mareos, vómito e incluso paro cardíaco.

**REACCIONES ADVERSAS:** La administración intravenosa (IV) muy rápida puede causar mareos, vómito y hasta paro cardíaco (cardiotóxico).

La aplicación IV puede producir hipercalemia, vómito, dolor abdominal, hiperazoemia y pancreatitis aguda.

**TIEMPO DE RETIRO:** Ninguno.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:**

Aunque no se ha demostrado si la administración del producto de calcio es inocua durante la gestación, a menudo se usa antes, durante y después del parto en vacas y ovejas para tratar la paresia parturienta secundaria a hipocalcemia.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:**

El calcio administrado por vía IV puede antagonizar los efectos de los bloqueantes de calcio (diltiazem, verapamilo, etc.).

Los pacientes tratados con digitálicos tienen más probabilidades de desarrollar arritmias si se les administra calcio vía IV, utilizar con cautela.

El calcio por vía parenteral puede neutralizar los efectos de la hiper magnesemia o de la toxicidad por su magnesio secundaria a la administración parenteral del sulfato de magnesio.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**PRESENTACIONES:**

Frasco x 100 ml

Frasco x 500 ml

**REGISTRO:** 10B-11992-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha  
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag  
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021  
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246  
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador