

MONTEBAN™ 100



Coccidiostato inonóforo granulado



COMPOSICIÓN: por kg de producto terminado:

Ingrediente Activo

Narasina100 g
Excipientes c.s.p.1 000 g

INDICACIONES:

POLLOS DE ENGORDE: Para tratamiento y control de la coccidiosis causada por *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. máxima*, *E. mivati*, *E. necatrix* y *E. tenella*.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO:

POLLOS: Mezcle cuidadosamente de 600 a 800 g de **MONTEBAN™ 100** en una tonelada métrica de alimento, para obtener de 60 a 80 g de Narasina (60 a 80 ppm), por tonelada de alimento preparado.

INSTRUCCIONES PARA SU ADMINISTRACION: Debe ser administrado continuamente en la ración alimenticia.

CONTRAINDICACIONES: Aves que consuman narasina no deben tratarse con productos que contengan Tiamulina o Troleandomicina. Puede ocurrir una severa depresión en el crecimiento.

PRECAUCIONES: No permitir el acceso a caballos u otros equinos a fórmulas que contengan **MONTEBAN™ 100**. La ingestión de **MONTEBAN™ 100** en equinos puede ser fatal. No alimentar a aves en producción, ni a pavos.

ADVERTENCIAS: Cuando se mezcle y transporte **MONTEBAN™ 100**, usar ropa protectora, guantes impermeables y máscara antipolvo, si ocurre contacto accidental con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua. Los operadores tendrán que lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manejar el producto. **MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

INSTRUCCIONES: Debe ser mezclado cuidadosamente en el alimento antes de usarse.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase a una temperatura inferior a 25°C. **ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO DESPUÉS DE LA FECHA DE EXPIRACIÓN IMPRESA EN EL SACO.**

PRESENTACIÓN:

Saco x 25 kg.

REGISTRO: 3A4-6444-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO