

NAFPENZAL DC®



Antibiótico intramamario para el secado
Aplicación intramamaria



COMPOSICIÓN: Por cada inyector de 3 gramos:

Nafcilina..... 100 mg
Penicilina procaínica.....300 000 UI
Dihidroestreptomicina..... 100 mg

INDICACIONES: Terapia de rutina durante el periodo seco. Infusión intramamaria de liberación lenta, óptima para proveer niveles terapéuticos durante todo el secado (60 días).

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Se recomienda aplicar 1 inyector por cuarto al momento del secado.

El sinergismo entre penicilina y estreptomicina produce una mayor actividad que el uso de cualquiera de estos productos por separado, y estos en combinación con la nafcilina semisintética, aseguran un amplio espectro de acción contra una gran variedad de bacterias incluyendo estafilococos resistentes a la penicilina.

PRESENTACIÓN:

Caja x 4 inyectores x 3 g.

REGISTRO: 2C2-6014-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: INTERVET INTERNATIONAL.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666