

NEUMOPIG



Bacterina para prevención de neumonía
Suspensión inyectable



FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:

Mycoplasma hyopneumoniae 1-5 X 10⁸ UFC
Vehículo c.s.p. 1 ml

ESPECIES: Porcinos.

DOSIS DE NEUMOPIG:

PRIMOVACUNADOS		
ESPECIE	VOLUMEN	APORTE (<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>)
LECHONES A partir de la primera semana de edad. (7 días de edad)	2 ml	1 x 5 x 10 ⁸ UFC/ml
CERDAS PREÑADAS (6 y 2 semanas antes del parto)	4 ml	
REVACUNACIÓN		
LECHONES (21 días de nacidos) 15 días luego de la primera dosis	2 ml	1 a 5 x 10 ⁸ UFC/ml
HEMBRAS (Antes de cada parto)	2 ml	
MACHOS REPRODUCTORES (Cada 6 meses)	2 ml	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.		

INDICACIONES DE USO: NEUMOPIG es una bacterina indicada para la prevención de la neumonía en cerdos, ocasionada por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD: La neumonía enzoótica porcina es una de las enfermedades más comunes que afecta a los cerdos en todo el mundo. Se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa, que afecta principalmente a los porcinos jóvenes predisponiéndolos a infecciones bacterianas secundarias.

La neumonía enzoótica es un síndrome con baja mortalidad, pero con grave impacto en los parámetros productivos en los cerdos de engorde, disminuyendo la ganancia media diaria y eficiencia.

MECANISMO DE ACCIÓN: Estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, previniendo la colonización de las bacterias: *Mycoplasma hyopneumoniae*, evitando la presentación de neumonía enzoótica en porcinos.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Use todo el contenido, queme los envases y contenido no usado.
- No aplicar en animales enfermos.
- No congelar.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS: En casos esporádicos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si sucediera administrar inmediatamente epinefrina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

RETIRO: 21 días antes del sacrificio.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml (10 dosis)
Frasco x 50 ml (25 dosis)
Frasco x 100 ml (50 dosis)

REGISTRO: 4C-13648-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador