

NEWCASTLE-BRONQUITIS FARBIOVET



Vacuna aviar
Liofilizado + diluyente



FÓRMULA: Cada dosis contiene:

Virus vivo modificado de Newcastle atenuado un 80% con un título mayor a 1×10^7 D_{IEP} 50% por dosis (origen líquido amniótico de pollos SPF)

Virus vivo modificado de Bronquitis atenuado un 80% con un título mayor a 1×10^6 D_{IEP} 50% POR DOSIS (origen líquido amniótico de pollos SPF)

Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES: Aves.

DOSIS DE NEWCASTLE-BRONQUITIS FARBIOVET:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVES	1 gota equivalente a 1 dosis (0.05 ml)	Intranasal, intraocular, oral o aerosol.

EN EL AGUA DE BEBIDA

SEMANA	50 DOSIS	100 DOSIS	500 DOSIS	1 000 DOSIS
1	1.0 l	2.0 l	10.0 l	20.0 l
2	1.5 l	2.9 l	14.7 l	29.4 l
3	2.2 l	4.4 l	22.1 l	44.1 l
4	2.9 l	5.9 l	29.4 l	58.8 l

Número de dosis = Número de aves.

Se aplica la vacuna en el 50% del agua que se va a consumir en un día.

INDICACIONES DE USO: Vacuna indicada para la prevención de la enfermedad de Newcastle y Bronquitis. Puede ser administrada en aves de diferentes edades de acuerdo a los planes de vacunación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intranasal, Intraocular, Oral o en Aerosol.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD:

NEWCASTLE: Infección altamente contagiosa que afecta a las aves. Se puede presentar en tres formas: lentogénica o leve, mesogénica o moderada, y velogénica o muy virulenta. Algunas cepas del virus atacan el sistema nervioso; otras, el sistema respiratorio o digestivo. Los signos clínicos incluyen: jadeo, tos, estornudos, parálisis de alas y patas, cuello torcido, espasmos, parálisis, diarrea, interrupción parcial o completa de la producción de huevos.

BRONQUITIS INFECCIOSA (BI): Enfermedad viral que afecta a aves de todas las edades. Es causada por el virus de la Bronquitis Infecciosa (VBI). Afecta al tracto respiratorio y urogenital, provocando signos como tos, descargas nasales, lagrimeo, disminución en la postura de huevos, entre otros.

MECANISMO DE ACCIÓN: Estimula una replicación viral tenue en el animal, pero no provoca una enfermedad clínica, brindando así inmunidad activa y protegiendo a las aves de una exposición natural al virus del Newcastle y Bronquitis aviar.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Aplicar la vacuna inmediatamente después de su reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el producto.
- No guardar sobrantes, los restos de la vacuna deben ser desechados.
- No vacunar animales enfermos, administrar solo animales sanos.
- No congelar.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS:

- En casos extremadamente escasos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.
- No existe un antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

RETIRO: No vacunar 21 días antes del sacrificio de las aves destinadas al consumo humano.

PRESENTACIONES:

- Frasco x 25 dosis
- Frasco x 50 dosis
- Frasco x 100 dosis
- Frasco x 500 dosis
- Frasco x 1 000 dosis
- Frasco x 2 500 dosis

REGISTRO: 4A-10172-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador
