

NOBILIS® SALENVAC T

**MSD**

Salud Animal

**Vacuna inactivada contra *Salmonella enteritidis****Suspensión inyectable*

COMPOSICIÓN: Antígeno inactivado de *Salmonella enteritidis* fago tipo 4 crecida bajo condiciones de restricción de hierro.

FORMULACIÓN: Solución acuosa conteniendo hidróxido de aluminio como adyuvante.

INDICACIONES: Vacunación de las aves como ayuda en el control de la infección por *S. enteritidis* PT4 para reproductoras y ponedoras.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN: Dependiendo de las condiciones locales éstas podrían incluir hasta 3 vacunaciones: 0.1 ml a los pollitos de 1 día de edad; 0.5 ml a las 4 semanas de edad, seguida por una dosis de refuerzo de 0.5 ml a las 18 semanas de edad. En otros casos se puede prescindir de la vacunación al día de edad.

DOSIS: 0.1 ml a los pollitos de 1 día de edad y 0.5 ml en aves mayores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Inyección intramuscular en el muslo.

PERÍODO DE RETIRO: Ninguno.

PRECAUCIONES:

- Vacunar sólo animales sanos.
- Antes de su uso, la vacuna debe estar a temperatura ambiente (20 – 25°C).
- Agitar bien el frasco de vacuna antes de su uso.
- Usar equipo de inyección esterilizado.
- Una vez abierta la vacuna debe usarse todo el contenido.
- No mezclar con otras vacunas.
- Si el vacunador se hincara por accidente, podría ocurrir una reacción local. Se recomienda acudir al doctor e informar al doctor que la vacuna es una emulsión oleosa.

ALMACENAMIENTO: Entre 2-8°C. Evitar el congelamiento. Los frascos abiertos deben ser usados dentro de las tres horas siguientes.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Cuando se usa de acuerdo a las instrucciones, ninguna.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

PRESENTACIÓN:

Frasco de plástico colapsable x 500 ml.

REGISTRO: 4A-7732-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: INTERVET INTERNATIONAL.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666