

NOVACYCLIN 100



Antibiótico
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina HCl..... 10 g
Excipiente especial c.s.p. 100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antibiótico.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución inyectable.

INDICACIONES DE USO: NOVACYCLIN 100 es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las tetraciclinas. Desarrollado para el control de infecciones bacterianas causadas por gérmenes Gram-negativos, Gram-positivos, rickettsias y espiroquetas. Su mecanismo de acción es inhibir el metabolismo celular bacteriano bloqueando el enlace de la transferencia aminoacil del RNA de los ribosomas, lo cual interfiere con la síntesis de las proteínas bacterianas.

NOVACYCLIN 100 está indicado para el tratamiento de infecciones del sistema respiratorio, reproductivo, digestivo y en general para todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles al producto.

EFICAZ EN CASOS DE: Tonsilitis, Neumonía, Metritis, Infecciones Genito-Urinarias, Enteritis, Neumoenteritis, Septicemia, Carbón sintomático, Edema maligno, Anaplasmosis, Leptospirosis, Rinitis atrófica, Control de infecciones post-operatorias, post-parto y heridas.

DOSIS SUGERIDA: Se puede implementar la siguiente tabla de dosificación.

ESPECIE	NOVACYCLIN 100
BOVINOS	1 ml NOVACYCLIN 100/10 kg PV
OVINOS	1 ml NOVACYCLIN 100/10 kg PV
CAPRINOS	1 ml NOVACYCLIN 100/10 kg PV
PORCINOS	1 ml NOVACYCLIN 100/10 kg PV
LAVADOS UTERINOS	20 ml disueltos en 20 ml de agua destilada.

La dosis debe aplicarse cada 24 horas y durante 3 a 5 días seguidos. En caso de Anaplasmosis duplicar la dosis.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda, intravenosa lenta, subcutánea o en lavados uterinos. En lechones aplicar vía subcutánea detrás de la oreja.

Cuando la dosis sea superior a 20 ml en bovinos, 10 ml en cerdos y 5 ml en ovinos aplicar en dos puntos distintos del cuerpo.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.
- Venta bajo receta médica.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: 3 días.

Carne: 7 días.

PRESENTACIONES:

Caja x 12 unidades

Frasco x 10 ml

Frasco x 100 ml

Frasco x 500 ml

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 2C1-12186-AGROCALIDAD

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436