

## OVULOMETRIX



**Antibiótico**  
Óvulos uterinos



**COMPOSICIÓN:** Cada óvulo contiene:

Ceftiofur HCL..... 0,50 g  
Excipientes c.s.p..... 1 óvulo

**INDICACIONES:** Es un óvulo intrauterino con suspensión antibiótica de Ceftiofur destinada al tratamiento de la inflamación del útero denominada metritis aguda o endometritis, estas alteraciones y la retención de placenta son desordenes que presentan los animales posteriores al parto, principalmente en ganado lechero.

**DOSIS:**

**Bovinos:** 2,2 mg/kg p.v cada 24 horas durante 3-5 días. Administrar un **OVULOMETRIX** por cada 230 kg p.v cada 24 horas durante 3-5 días. Intrauterina

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intrauterina.

**CONTRAINDICACIONES:** Las cefalosporinas están contraindicadas en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a ellas. Usar las cefalosporinas con cautela en pacientes con hipersensibilidad documentada a otros antibióticos beta-lactámicos (ejemplo, penicilinas, cefamicinas, carbapenemas). Los bovinos tratados con clorhidrato de Ceftiofur no deben ser faenados durante 3 días posterior al último tratamiento. No hay tiempo de descarte de leche.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los efectos adversos con las cefalosporinas no suelen ser serios y tienen una frecuencia de presentación relativamente baja.

Las reacciones de hipersensibilidad no relacionadas con la dosis pueden ocurrir con estos agentes y pueden expresarse como erupción cutánea, fiebre, eosinofilia, linfadenopatía o anafilaxia completa.

**ADVERTENCIAS: USO EXCLUSIVO EN ANIMALES. NO PARA USO HUMANO.** Evite el contacto directo del producto con la piel, los ojos y la boca. La sensibilización de la piel se puede evitar si usa guantes protectores. Las personas con una hipersensibilidad conocida a la penicilina o a las cefalosporinas deben evitar la exposición a este producto. En caso de exposición accidental de la piel, lave con agua y jabón. Si se produce una reacción alérgica, busque atención médica.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:** No se han determinado los efectos del Ceftiofur sobre el rendimiento reproductivo, la preñez y la lactancia. Sin embargo, las cefalosporinas como clase son relativamente seguras para usar durante la gestación y no se deberían esperar efectos teratogénicos o embriotóxicos.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:** Bloquea en forma competitiva la secreción tubular de la mayoría de las cefalosporinas, con lo cual aumenta los niveles en suero y la vida media sérica de la probenecida.

**TIEMPO DE RETIRO:** Carne 3 días antes del sacrificio.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**DECLARACIÓN DE VENTA:** Con prescripción Médico Veterinaria.

**PRESENTACIONES:**

Óvulo x 5 ml (caja x 25 unidades)  
Óvulo x 5 ml (caja x 50 unidades)

**REGISTRO:** 2C1-14095-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha  
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag  
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021  
**SERVICIO AL CLIENTE:** 1800327246

[www.farbiopharma.com/](http://www.farbiopharma.com/) Quito-Ecuador