OXI STRESS

Multivitamínico, antibiótico (promotor de crecimiento)
Oral

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina
HCl..... 50 g
Vitamina A.....10 000 000 UI
Vitamina D_3.....25 000 000 UI
Vitamina E ..... 2 600 mg
Vitamina K_3 (menadiona)..... 1 500 mg
Vitamina B_1 (tiamina)..... 750 mg
Vitamina B_2 (riboflavina) ..... 1 000 mg
Vitamina B_6 (piridoxina) ..... 1 000 mg
Vitamina B_{12} (cianocobalamina) ..... 10 mg
Vitamina B_3 (nicotinamida) ..... 1 000 mg
Vitamina B_5 (pantotenato de calcio) ..... 3 250 mg
Oligoelementos:
Sulfato de hierro ..... 0.5 g
Sulfato de manganeso..... 0.4 g
Sulfato de zinc..... 0.15 g
Sulfato de cobre ..... 0,04 g
Vitamina C ..... 10 000 mg
Ácido Fólico..... 200 mg
Excipientes c.s.p. ..... 1 000 g

GENERALIDADES: Producto adecuado para la aplicación en aves estresadas en pico de producción, recibimientos, manejos, traslados y despiques.

PROPIEDADES: Es una potente combinación de vitaminas, oligoelementos y antibiótico, para optimizar el desempeño de las especies de destino, mejora la producción de huevos, carne y estado general de los animales, corrige deficiencias de vitaminas y evita estrés en el animal en picos de producción.
La oxitetraciclina actúa directamente sobre bacterias sensibles como: *Streptococcus B-hemolítico* y no hemolítico, *Clostridium* spp., *Brucela* spp., *Haemophilus* spp. y *Klebsiella pneumoniae*. Moderadamente sensibles son: *Corynebacterium* spp., *Escherichia coli*, *Pasterela* spp., *Salmonella* spp.

INDICACIONES:
Aves: Deficiencia de vitaminas y minerales, para la recepción de aves, preventivo del estrés en prácticas de vacunación, despiques y traslados y para prevención de enfermedades bacterianas.
Terneros, cerdos, lechones, ovinos, caprinos, conejos y cobayos: Para prevenir infecciones no específicas, destete, cambio de dieta, variaciones de temperatura, transporte y otras condiciones de estrés.

DOSIS DE OXI STRESS:

ESPECIES	mg/kg
AVES	1 g / 1 l de agua o alimento durante 5 días
BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS, CERDOS	5-10 g por animal adulto

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 8 días.

PRECAUCIONES:
- No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas, alteraciones hepáticas, ni a vacas lecheras en producción.
- Almacenar en sitio fresco, seco, protegido de la luz, a menos de 30 º C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.
- Una vez abierto el envase, utilizar todo el contenido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine el envase luego de utilizar el producto.

PRESENTACIONES:
Sobres x 20 g
Sobres x 100 g
Tarro x 1 000 g

REGISTRO: 2C1-10A2-11190-AGROCALIDAD

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.