

OXITER 200 L.A.



Antibiótico + Antiinflamatorio no esteroideo
Solución inyectable



DESCRIPCIÓN: Oxitetraciclina - Flunixin.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Oxitetraciclina base	226.5 mg
Flunixin meglumine	10 mg
Excipientes c.s.p.....	1 ml

INDICACIONES: Antibiótico de amplio espectro más antiinflamatorio no hormonal, para el tratamiento de infecciones por gérmenes Gram positivos y Gram negativos causantes de pasteurelosis, colibacilosis, salmonelosis, anaplasmosis, difteria, metritis, pododermatitis, neumonías, en bovinos, porcinos y equinos.

DOSIS:

Bovinos: 1 ml x cada 20 kg de peso.

Equinos: 1 ml x cada 20 kg de peso.

Porcinos: 0.5 a 1 ml x cada 10 kg de peso.

Repetir el tratamiento a las 48 horas.

APLICACIÓN: Vía intramuscular profunda, intravenosa lenta con solución dextrosada, en lavados uterinos diluido en agua destilada. Uso Veterinario.

ADVERTENCIAS:

- No administrar a hembras gestantes.
- No aplicar en equinos en entrenamiento en los 8 días previos a la carrera.
- Oxitetraciclina tiene un amplio margen de seguridad, no administre junto con betalactámicos, soluciones de calcio, aluminio o hierro, son incompatibles. Antídoto no disponible.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Tiempo de Retiro: Leche - No administrar en vacas en producción de leche destinada al consumo humano. Carne - 28 días.
- Eliminar los envases en lugares autorizados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

REGISTRO: Ecuador Reg. No. 2C1-8A4-11699-AGROCALIDAD

Bolivia Reg. SENASAG PUV-F No. 005553/13

Guatemala MAGA No. EC432-07-01-3027

Venezuela: M.I.12.327

Perú Reg. SENASA No. F.71.01.I.00070

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com