

OXITETRACICLINA FARBIOVET



Antibiótico de amplio espectro
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

| | |
|--------------------------|-------|
| Oxitetraciclina HCl..... | 95 g |
| Excipiente c.s.p..... | 100 g |

INDICACIONES: OXITETRACICLINA FARBIOVET antibiótico bacteriostático de amplio espectro que ejerce su acción por inhibición de la síntesis proteica impidiendo la relación codón-anticodón bajo la dirección del ácido ribonucleico mensajero. Está indicado en el tratamiento y control de diarreas, infecciones gastrointestinales, causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas. *Clostridium* spp.; *Pasteurella* spp.; *Campylobacter* spp.; *Hæmophilus* spp.; *Klebsiella* spp.; *Sphaerophorus necrophorus*; *Escherichia coli*; *Salmonella* spp.; *Shigella* spp.; *Actinobacillus* spp.; *Leptospira pomona*; *Erysipelothrix insidiosus*; *Corynebacterium* spp.; *Listeria* spp.; *Streptococcus* spp.; *Staphylococcus* spp.), microorganismos de los grupos *Chlamydiæ*, *Mycoplasmatacæ*, algunos hongos (*Dermatophilus congolensis*).

DOSIS:

AVES: Dosificación (Referencial 1 000 aves) Oxitetraciclina 500 ppm (500 mg/kg p.v).

| OXITETRACICLINA FARBIOVET | Cantidad de Agua de Bebida | Cantidad de Alimento | Edades semanas | Peso promedio |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 93,72 g | 56 l agua | 11,8 kg | 0-1 | 165 g |
| 227,2 g | 125 l agua | 16,8 kg | 1-2 | 400 g |
| 511,2 g | 174 l agua | 23,1 kg | 2-3 | 900 g |
| 795,2 g | 226 l agua | 29,9 kg | 3-4 | 1 400 g |
| 1.132 g | 264 l agua | 35,8 kg | 4 o más | 2 000 g |

CERDOS: Dosificación (Referencial 1 000 cerdos) Oxitetraciclina 22 mg/kg/día se requiere 25 g de OXITETRACICLINA FARBIOVET por cada tonelada de alimento.

| OXITETRACICLINA FARBIOVET | Cantidad de Alimento | Edades semanas | Peso promedio |
|---------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 31 g | 680 kg | 1-6 | ≤11 kg |
| 31-41 g | 680-900 kg | 6-11 | 11-25 kg |
| 62-100 g | 1.360-2.270 kg | 11-18 | 25-55 kg |
| 100-124 g | 2.270-2.720 kg | 18-28 | 55-90 kg |

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía Oral.

Se recomienda de 5-7 días consecutivos de tratamiento cada 24 horas, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES: En hembras gestantes puede inducir coloración anormal de las piezas dentarias del neonato.

ADVERTENCIAS: No se debe administrar en ponedoras en producción de huevos destinados al consumo humano.

REACCIONES ADVERSAS: Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Debido a una acción inotrópica y vasodilatadora negativa, produce disminución de la presión sanguínea. Debe administrarse con precaución en casos de insuficiencia renal.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Las tetraciclinas son excretadas en la leche pero como gran parte de la droga estará unida al calcio lácteo, es poco probable que sea importante para las crías en lactancia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La oxitetraciclina es químicamente incompatible con amikacina y otros aminoglucósidos, ampicilina sódica, glucocorticoides, penicilina G, etc. Por lo tanto no debe combinarse. Cuando son administradas oralmente, puede quelar cationes di o trivalentes, el bicarbonato de sodio, kaolin, pectina y subsalicato de bismuto lo cual puede disminuir la absorción de la oxitetraciclina o del otro fármaco.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 28 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Sobre x 1 kg.

REGISTRO: 2C1-13454-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador