

## OXITETRAFAFAR 200 L.A. + DICLOFENACO®



**Antibiótico y antiinflamatorio de amplio espectro**  
*Injectable*



### COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Oxitetraciclina .....    | 20 g   |
| Diclofenaco sódico ..... | 0.05 g |
| Excipientes c.s.p.....   | 100 ml |

**CARACTERÍSTICAS: OXITETRAFAFAR 200 L.A. + DICLOFENACO**, es una solución estéril estable de altísima concentración, ideada para mantener niveles terapéuticos por un período de 3 a 5 días, después de una sola aplicación. Además de la alta concentración, dosis reducida y el anestésico incorporado, facilita la inoculación y disminuye las molestias a los animales.

El diclofenaco, gracias a su acción antiinflamatoria favorece la recuperación del animal y de su producción.

El efecto bacteriostático de amplio espectro más su calidad atóxica en general, asegura un tratamiento adecuado contra un sinnúmero de enfermedades bacterianas. Después de la inoculación parenteral, la OXITETRACICLINA penetra rápidamente en la sangre y tejidos produciendo altas concentraciones en los mismos. Además los niveles terapéuticos del producto permanecen en el torrente sanguíneo por tiempo prolongado en consecuencia, una inyección cada 48 - 72 horas es suficiente.

**INDICACIONES:** Está recomendado en infecciones del tracto respiratorio, urogenital y digestivo.

Sus principales usos clínicos son: Actinomicosis, actinobacilosis, tonsilitis, neumonías, septicemias, enteritis, neumoenteritis, metritis, otras infecciones génito-urinarias, leptospirosis, mastitis, infecciones bacterianas secundarias no específicas, podredumbre de pezuñas, carbunco bacteriano, carbunco sintomático, anaplasmosis, control de infecciones post operatorias, post parto y heridas.

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos:** 1 ml por cada 10 kilos de peso por vía intramuscular (I.M.) profunda.

**Lechones:** 1 ml por animal aunque su peso sea inferior a 10 kilos, aplicar por vía subcutánea detrás de la oreja.

Por cualquiera de las vías de administración se recomienda no inyectar en el mismo sitio más de 20 ml, en bovinos 10 ml/ 100 kg, en porcinos, ovinos y caprinos 5 ml/ 50 kg; distribuir en dos puntos diferentes.

### PRECAUCIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No administrar 21 días antes del sacrificio de los animales.
- La leche de los animales tratados no destinar al consumo humano hasta 7 días después del último tratamiento.

### TIEMPO DE RETIRO:

**Leche:** 7 días después del último tratamiento.

**Carne:** 21 días después del último tratamiento.

**CONTRAINDICACIONES:** No administrar oxitetraciclina en animales sensibles a la tetraciclina, ni en infecciones resistentes a la misma.

### PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

**REGISTRO:** 2C1-2984-AGROCALIDAD.

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** INDUFAR ECUADOR