

OXITRAX 100



Antibiótico de amplio espectro
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina 10 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: Para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram+ y Gram negativas, como infecciones podales y articulares, anaplasmosis, mastitis, endometritis, infecciones genitales, queratoconjuntivitis, enteritis bacteriana y algunos hongos.

DOSIS:

Bovinos: 0,8 ml/10 kg.

Terneros: 0,3 ml/10 kg.

Equinos: 1 ml/10 kg.

Potros: 0,5 ml/10 kg.

Cerdos: 0,8 ml/10 kg.

Lechones: 0,5 ml/10 kg.

Caninos: 1 ml/10 kg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o Intravenoso.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar más de 20 ml en el mismo punto de inyección. Las inyecciones IV colocar lentamente por lo menos con un minuto de duración. No usar en tratamiento con corticoides en equinos.

ADVERTENCIAS: No administrar en animales alérgicos a la Oxitetraciclina. La vía endovenosa no debe ser usada en caninos.

REACCIONES ADVERSAS: En animales jóvenes puede causar la coloración amarilla, marrón o gris de los huesos y los dientes. Altas dosis y tratamientos prolongados puede demorar el desarrollo de los huesos y la cicatrización.

Cuando se aplican por vía IM es posible observar reacciones locales, tinción amarillenta y necrosis en el sitio de inyección.

En pequeños animales, puede causar náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. Hay informes que mencionan que la administración por tiempo prolongado de tetraciclinas puede causar la formación de urolitos en los perros.

El tratamiento prolongado puede producir un sobrecrecimiento de bacterias u hongos no susceptibles.

En caballos estresados por cirugías, anestesia, trauma, etc., se pueden manifestar graves diarreas después de recibir tetraciclinas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Las tetraciclinas son excretadas en la leche materna. Debido a la posibilidad de importantes reacciones adversas, decidir si se suspende la lactación o la administración de la droga.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No administrar con Beta-Lactámicos o Aminoglicósidos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 21 días y Leche 6 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml

Frasco x 20 ml
Frasco x 50 ml
Frasco x 100 ml
Frasco x 500 ml

REGISTRO: 1C1-10918-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador