

OXITRAX FLU 200



Antibiótico-antiinflamatorio
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina.....	20 g
Flunixin Meglumine.....	0,90 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Para infecciones causadas por agentes etiológicos susceptibles a la oxitetraciclina como Bacterias Gram+ y Gram negativas (*Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp.; *Pasteurella* spp., *Campylobacter* spp., *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Sphaerophorus necrophorus*; *Escherichia coli*, *Salmonella* spp.; *Shigella* spp., *Actinobacillus* spp., *Actinomyces bovis*; *Leptospira pomona*; *Moraxella bovis*; *Erysipelothrix insidiosus*; *Corynebacterium* spp.; *Listeria* spp.; *Streptococcus* spp.; *Staphylococcus* spp.) y algunos hongos (*Dermatophilus congolensis*) en bovinos, ovinos y porcinos. Además el Flunixin Meglumine actúa como antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

DOSIS:

Bovinos, ovinos y porcinos: 1 ml/10 kg p.v (20 mg/kg).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar más de 20 ml en el mismo punto de inyección.

ADVERTENCIAS: Puede presentar choque anafiláctico e irritación en el sitio de aplicación IV en vacas, así como hipotensión y alteraciones del ritmo cardíaco.

REACCIONES ADVERSAS: En animales jóvenes puede causar la coloración amarilla, marrón o gris de los huesos y los dientes. Altas dosis y tratamientos prolongados pueden demorar el desarrollo de los huesos y la cicatrización.

Cuando se aplican por vía IM es posible observar reacciones locales, tinción amarillenta y necrosis en el sitio de inyección.

El tratamiento prolongado puede producir un sobrecrecimiento de bacterias u hongos no susceptibles.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

Las tetraciclinas son excretadas en la leche materna. Debido a la posibilidad de importantes reacciones adversas, decidir si se suspende la lactación o la administración de la droga.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No administrar con Beta-Lactámicos o Aminoglucósidos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 28 días antes del sacrificio. No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

- Frasco x 10 ml
- Frasco x 20 ml
- Frasco x 50 ml
- Frasco x 100 ml
- Frasco x 250 ml

REGISTRO: 2C1-12605-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador