

OXITRAX POLVO



Antibiótico
Polvo



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Oxitetraciclina.....	15 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento y control de diarreas, infecciones gastrointestinales causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas.

DOSIS:

Bovinos y Equinos: Adultos 20 g.

Lechones: 5-10 g.

Porcinos: Adultos 20 g.

Caninos: Adultos 10 g. Cachorros 5-10 g.

Aves para *Mycoplasma synoviae* Sinovitis 0,6-1,2 g/litro de agua.

Aves para *Mycoplasma gallisepticum* y *Escherichia coli* 0,8-1,6 g/litro de agua.

Aves para Cólera aviar 1,6-3,2 g/litro de agua.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Su uso en hembras gestantes puede inducir coloración anormal en las piezas dentarias de neonatos. La oxitetraciclina es químicamente incompatible con amikacina y otros aminoglucósidos, ampicilina sódica, glucocorticoides, penicilina G, etc., por lo tanto no debe combinarse.

ADVERTENCIAS: Utilizar soluciones frescas y desechar los sobrantes. No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. No administrar en vacas en producción de leche destinada al consumo humano. Terminado el contenido eliminar el envase vía recolector público.

REACCIONES ADVERSAS: En animales jóvenes puede causar la coloración amarilla, marrón o gris de los huesos y los dientes. Altas dosis y tratamientos prolongados puede demorar el desarrollo de los huesos y la cicatrización. Cuando se aplican por vía IM es posible observar reacciones locales, tinción amarillenta y necrosis en el sitio de inyección. En pequeños animales, puede causar náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. Hay informes que mencionan que la administración por tiempo prolongado de tetraciclina puede causar la formación de urolitos en los perros.

El tratamiento prolongado puede producir un sobrecrecimiento de bacterias u hongos no susceptibles. En caballos estresados por cirugías, anestesia, trauma, etc., se pueden manifestar graves diarreas después de recibir tetraciclina.

USO DURANTE LA GESTACIÓN LA LACTANCIA O LA PUESTA:

Las tetraciclina son excretadas en la leche materna. Debido a la posibilidad de importantes reacciones adversas, decidir si se suspende la lactación o la administración de la droga.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

No administrar con Beta-Lactámicos o Aminoglucósidos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 28 días, no administrar en vacas en producción de leche destinada al consumo humano.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura Entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Fundas x 20 g.

Fundas x 100 g.

Fundas x 1 kg.

REGISTRO: 2C-11963-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador