

OXITRAX



Antibiótico-antiinflamatorio
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina.....	10 g
Flunixin Meglumine.....	0,65 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Para infecciones causadas por gérmenes susceptibles a las tetraciclinas en bovinos y porcinos. En perros para afecciones de moquillo. Además el Flunixin Meglumine actúa como antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

DOSIS:

Bovinos: 10 ml/100 kg.

Cerdos: 3 ml/50 kg.

Caninos: 1 ml/10 kg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar más de 20 ml en el mismo punto de inyección.

ADVERTENCIAS: Puede presentar choque anafiláctico e irritación en el sitio de aplicación.

Flunixin en bovinos puede causar irritación y un cierto grado de necrosis, por lo que debe preferirse en esta especie la vía endovenosa. No administrarse en hembras gestantes. No usar en casos de daño renal o hepáticos severos, ni en animales con lesiones de mucosa gastrointestinal causadas por endoparásitos. No usar en cólicos causados por ileo y asociación con deshidratación. No administrar a caninos menores de tres meses de edad. El uso prolongado de oxitetraciclina puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Debido a una acción inotrópica y vasodilatadora negativa, produce disminución de la presión sanguínea. Irritación en sitio de inyección. Debe evitarse el uso prolongado en caninos debilitados o cuando se esté administrando otra terapia antiinflamatoria.

REACCIONES ADVERSAS: En animales jóvenes puede causar la coloración amarilla, marrón o gris de los huesos y los dientes. Altas dosis y tratamientos prolongados puede demorar el desarrollo de los huesos y la cicatrización. Cuando se aplican por vía IM es posible observar reacciones locales, tinción amarillenta y necrosis en el sitio de inyección. En pequeños animales, puede causar náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. Hay informes que mencionan que la administración por tiempo prolongado de tetraciclinas puede causar la formación de urolitos en los perros. El tratamiento prolongado puede producir un sobrecrecimiento de bacterias u hongos no susceptibles.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Las tetraciclinas son excretadas en la leche materna. Debido a la posibilidad de importantes reacciones adversas, decidir si se suspende la lactación o la administración de la droga.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No administrar con Beta-Lactámicos o Aminoglucósidos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 28 días antes del sacrificio. No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera

del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml

Frasco x 20 ml

Frasco x 50 ml

Frasco x 100 ml

REGISTRO: 2C1-7900-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador