

## OXIVET 12%



### Antibiótico + antiinflamatorio inyectable

Vía intravenosa lenta, intramuscular, subcutánea o intrauterina



#### COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina Clorhidrato .....	12 g
Flunixin Meglumine.....	1 g
Excipientes c.s.p. ....	100 ml

**GENERALIDADES:** Solución antibiótica combinada con antiinflamatorio (analgésico y antipirético).

**PROPIEDADES:** Combina un antibiótico y analgésico, que actúan en forma sinérgica para combatir las infecciones y al mismo tiempo controlar el dolor en los animales. Las tetraciclinas, son antibióticos de amplio espectro que tienen eficacia frente a bacterias, micoplasmas y algunos protozoos. En términos generales, son bacteriostáticos y afectan a microorganismos en fase de multiplicación rápida. La Oxitetraciclina actúa directamente sobre bacterias sensibles como: *Streptococcus B-hemolítico* y no hemolítico, *Clostridium* spp., *Brucela* spp., *Haemophilus* spp. y *Klebsiella pneumoniae*. Moderadamente sensibles son: *Corynebacterium* spp., *Escherichia coli*, *Pasterela* spp., *Salmonella* spp. El Flunixin Meglumine, es un antiinflamatorio no esterooidal, analgésico no narcótico con efectos antipiréticos (AINE), que tiene un potente efecto a través de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, lo que alivia los síntomas de la inflamación.

**INDICACIONES:** Eficaz en el tratamiento de neumonías, neuromoenteritis, septicemias, anaplasmosis, carbunco, panadizo, micoplasmosis, infecciones post-operatorias y metritis en bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos. En aves, recomendado para Coriza Infecciosa, problemas respiratorios y digestivos bacterianos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intravenosa lenta, intramuscular, subcutánea o intrauterina.

**DOSIS:** Administrar por 5 días el tratamiento.

ESPECIES	DOSIS DE PRODUCTO POR kg DE PESO	MG OXITETRACICLINA / kg PESO
BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, PORCINOS	5 ml / 100 kg	5 – 10 mg / kg
EQUINOS	4 ml / 100 kg	3 - 5 mg / kg
AVES	0,1 ml / 1 kg	6 mg / kg

#### TIEMPO DE RETIRO:

**Leche:** 2 días.

**Carne:** 21 días.

#### PRECAUCIONES:

- Almacenar en sitio fresco, seco, protegido de la luz, a menos de 30 ° C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.
- Una vez abierto el frasco, utilizar todo el contenido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine el envase luego de utilizar el producto.

#### PRESENTACIONES:

- Frasco x 10 ml
- Frasco x 20 ml
- Frasco x 50 ml
- Frasco x 100 ml

Frasco x 250 ml  
Frasco x 500 ml

**REGISTRO:** 2C1-12064-AGROCALIDAD

**FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:** LAVETEC CÍA. LTDA.