

PANACUR®

Antiparasitario de amplio espectro
Uso oral

**COMPOSICIÓN:**

Suspensión al 10%: Cada ml contiene 100 mg de FENBENDAZOL original.

Granulado al 22%: Cada g contiene 22 mg de FENBENDAZOL original.

INDICACIONES:

Rumiantes: Infestaciones con nematodos gastrointestinales y pulmonares e infestaciones con cestodos (tenias).

Porcinos: Infestación con nematodos gastrointestinales, parásitos pulmonares y renales.

Equinos: Infestación con estrongílicos grandes y pequeños, ascárides, oxiuros, estrongiloides.

DOSIFICACIÓN:

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 5 mg/kg de peso equivalente a 5 ml/100 kg de peso de la suspensión al 10%, o equivalente a 2.3 g/100 kg de peso del granulado al 22%.

Equinos: 7.5 mg/kg de peso, equivalente a 7.5 ml/100 kg de peso de la suspensión al 10% o equivalente a 3.4 g/100 kg de peso de granulado al 22%.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 11 días.

Leche: 5 días después del último tratamiento.

PRESENTACIONES:

Suspensión al 10%:

Frasco x 100 ml.

Frasco x 1 000 ml.

Granulado al 22%:

Sobre x 10 g.

REGISTRO: Granulado al 22%: 3A1-7659-AGROCALIDAD.

REGISTRO: Suspensión al 10%: 3A1-1097-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: INTERVET DO BRASIL-INTERVET GMBH.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666