

PIPERAZINA FARBIOVET



Antiparasitario interno
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Piperazina..... 53 g
Excipientes c.s.p..... 100 g

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de gusanos redondos en aves, así como gusanos nodulares, lombrices en porcinos, equinos y bovinos.

DOSIS DE PIPERAZINA FARBIOVET:

ESPECIE	ETAPA	Nº AVES	DOSIS
AVES	Aves menores a 6 semanas	60	10 g en 10 litros de agua.
	Aves mayores de 6 semanas	30	

ESPECIE	DOSIS
BOVINOS	10 g por cada 50 kg p.v
EQUINOS	10 g por cada 50 kg p.v
PORCINOS	4 g por cada 25 kg p.v

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: Animales con deficiencia renal y/o tránsito gastrointestinal rápido.

ADVERTENCIAS: Usar las dosis recomendadas para evitar resistencia.

REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas no son comunes en dosis terapéuticas. Equinos adultos y potros toleran el fármaco muy bien, incluso en dosis elevadas, pero en ocasiones pueden presentar heces blandas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Es una droga probablemente segura. No se ha encontrado información, pero es probable que su uso durante la lactancia sea seguro.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: El pirantel/Morantel no debe administrarse junto con Piperazina ya que tienen modos de acción antagónicos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 3 días. Huevos y leche: 1 día.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Fundas x 10 g.
Fundas x 100 g.
Fundas x 1 000 g.

REGISTRO: 3A2-11835-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021