

PIRANTEL PAMOATO



Antiparasitario interno
Suspensión oral



FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:

Pirantel Pamoato (25 mg de Pirante base) 72.0 mg
Excipientes c.s.p. 1.0 ml

ESPECIES: Caninos y felinos.

DOSIS DE PIRANTEL PAMOATO:

ESPECIE	DOSIS PIRANTEL PAMOATO	INDICACIONES
CANINOS	DOSIS DE REFERENCIA: 5 mg/kg	
	1 ml/5 kg de peso vivo	Adultos: Dosis única repetir a los 7-10 días. Cachorros: Pueden ser tratados a la 2, 3, 4, 6, 8 y 10 semanas de vida.
FELINOS	DOSIS DE REFERENCIA: 20 mg/kg	
	2 ml/2.5 kg de peso vivo	Adultos: Dosis única. Gatitos: Pueden ser tratados a partir de la 2 semana de vida con un intervalo de 2 semanas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. La duración del tratamiento, la dosis y frecuencia de administración del producto pueden ser modificadas a criterio del Médico Veterinario.		

INDICACIONES DE USO: Desparasitante oral de amplio espectro, efectivo en el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales de perros y gatos, tales como: *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

FARMACOCINÉTICA: El pamoato de pirantel es mal absorbido desde el tracto gastrointestinal lo que permite, de esta manera, que el fármaco alcance la parte inferior del tracto en perros, gatos y equinos. El fármaco se metaboliza con rapidez y se excreta en la orina.

MECANISMO DE ACCIÓN: El pirantel actúa como un bloqueante neuromuscular despolarizante en parásitos susceptibles, a los que paraliza. La droga posee propiedades nicotínicas y actúa en forma similar a la acetilcolina. También inhibe la colinesterasa.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- No sobrepasar la dosis recomendada.
- No usar en animales extremadamente debilitados.

INTERACCIONES:

- No utilizar junto con el levamisol ni el morantel, debido a mecanismos de acción y toxicidad similares.
- El uso concomitante con organosfosforados incrementa el riesgo de efectos adversos.
- El pirantel y la piperazina tienen mecanismos de acción antagónicos no se recomienda utilizarlos juntos.

REACCIONES ADVERSAS: Cuando se administra a dosis recomendadas los efectos adversos son poco probables. Es posible la presencia de emesis en pequeños animales.

RETIRO: No aplica.

PRESENTACIONES:

Jeringa x 2 ml
Jeringa x 5 ml
Frasco x 100 ml
Frasco x 500 ml

REGISTRO: 3A1-4868-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Píntag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador