

PIROBENZ PLUS



Antihematozoárico
Solución inyectable



DESCRIPCIÓN: Para el control de hematozoarios, transmitidos por garrapatas e insectos.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Oxitetraciclina base	100 mg
Diaceturato de 4' 4 Diazoamino Dibenzamidina.....	40 mg
Antipirina.....	110 mg
Excipientes c.s.p.....	1 ml

INDICACIONES:

Para el tratamiento de piroplasmosis, anaplasmosis (fiebre de garrapata), tripanosomiasis (mal de caderas), transmitidas por garrapatas e insectos en bovinos, equinos y caninos.

La aplicación oportuna está indicada para el control de las enfermedades ocasionadas por hematozoarios.

DOSIS:

Bovinos, equinos, caninos: 3.5 mg por kg = 1 ml por cada 10 kg de peso.

En casos necesarios repetir la dosis a las 24 horas.

En equinos dividir la dosis en dos partes y administrar con intervalo de 3 horas.

APLICACIÓN: Vía Intramuscular profunda.

Uso veterinario.

ADVERTENCIAS:

- Cuando se sobredosifica es tóxico para el sistema nervioso, produce ataxia y convulsiones:
- Puede ocasionar hipersensibilidad, en esos casos use antihistamínicos o epinefrina.
- En el sitio de inoculación puede causar inflamación que se supera sola.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Eliminar los envases en un lugar autorizado.
- Tiempo de Retiro: Carne: 21 días y Leche: 4 días.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco de vidrio x 50 ml.

Frasco de vidrio x 100 ml.

Frasco de vidrio x 250 ml.

REGISTRO:

Ecuador Reg. No. 2C1-6920-AGROCALIDAD

Panamá: RF-5379-10

Bolivia Reg. SENASAG PUV -F No. 001000/05

Venezuela:M.I.9.604

Guatemala MAGA No. 11-03-09-13,557

Paraguay Reg. SENACSA No. 12.689

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com