

PORCILIS® APP



**Vacuna contra la pleuroneumonía producida por
Actinobacillus pleuropneumoniae en cerdos**



COMPOSICIÓN:

Actinobacillus pleuropneumoniae,
proteína de la membrana externa (PME): 50 U
Actinobacillus pleuropneumoniae, toxoide Apxl: 50 U
Actinobacillus pleuropneumoniae, toxoide ApxII: 25 a 78 U
Actinobacillus pleuropneumoniae, toxoide ApxIII: 50 U
Excipientes c.s.p.: 2 ml

* Los ingredientes activos con 4 antígenos, los cuales cubren el espectro de todos los serotipos conocidos de *A. pleuropneumoniae*. Todos los serotipos contienen el antígeno OMP (Proteína de Membrana Externa), y expresan al menos una de las 3 toxinas termolábiles de proteína natural (Apxl, hemolisina tipo I, ApxII, hemolisina tipo II y ApxIII, toxina de macrófago). Cada dosis de vacuna contiene 50 unidades de cada uno de estos 4 antígenos.

DESCRIPCIÓN: PORCILIS® APP es una vacuna subunitaria, inactivada y suspendida en adyuvante Diluvac® Forte para la inmunización de cerdos sanos contra la pleuroneumonía porcina causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

INDICACIONES: Para la inmunización de cerdos sanos contra la pleuroneumonía porcina causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Aplicar 2 inyecciones de 2 ml c/u; la primera por vía subcutánea en el pliegue de la pierna y la segunda por vía intramuscular profunda detrás de la oreja.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN: La máxima protección deberá lograrse antes del inicio del periodo de engorda. Los cerdos pueden ser vacunados desde las 6 semanas de edad. Se requieren dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 4 semanas entre sí. Se recomienda aplicarlas a la 6ª y 10ª semanas de edad. Es conveniente suspender el alimento 12 horas antes de la vacunación.

REACCIONES ADVERSAS: Los cerdos pueden mostrar fiebre moderada, apatía y falta de apetito. Ocasionalmente puede ocurrir vómito. En algunos animales puede llegar a presentarse inflamación ligera en el sitio de aplicación. Estas reacciones desaparecerán dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación de la vacuna.

ADVERTENCIAS:

- Vacunar únicamente cerdos sanos.
- Antes de utilizar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente (18-25°C).
- Agítese antes y durante la vacunación.
- Una vez abierto el frasco, utilice todo su contenido.
- Si esto no es factible, extreme los cuidados para evitar su contaminación.
- Deseche el frasco mediante incineración.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- Consérvese entre 2 y 8°C.
- No congelar.

PERIODO DE RETIRO: 0 días.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 100 ml (50 dosis).

REGISTRO: 4C-11669-AGROCALIDAD

FABRICADO POR: INTERVET-SCHERING PLOUGH ANIMAL

HEALTH B.V.
Wim de Korverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.
Km 5,5 VÍA DAULE
Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666