PORCILIS® PORCOLI DF

MSD Salud Animal

IMPVET

Vacuna contra la enterotoxicosis neonatal
Solución inyectable

DESCRIPCIÓN: PORCILIS® PORCOLI DF es una vacuna inactivada contra la enterotoxicosis neonatal en lechones causada por *E.coli*. La protección contra la infección es transferida desde las cerdas y chanchillas vacunadas a los lechones mediante los anticuerpos pasivos maternales ingeridos con el calostro.

COMPOSICIÓN: PORCILIS® PORCOLI DF contiene Toxoide LT de *E.coli* y los antígenos fimbriales purificados F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5(K99) y F6 (987 P) de cepas enteropatógenas de *E. coli*. Estos componentes activos están suspendidos en un adyuvante acuoso (Diluvac Forte).

FORMULACIÓN: Vacuna inactivada lista para usar.

INDICACIONES: Vacuna bacterial inactivada para la inmunización pasiva de lechones por inmunización activa de las cerdas, con esta vacuna se reduce la mortalidad y signos clínicos de la diarrea neonatal en lechones (Enterotoxicosis). La progenie de multíparas y primerizas vacunadas apropiadamente están protegidas contra la infección de *E.coli* al alimentarse durante las primeras horas de su vida, de esta manera adquieren inmunidad pasiva vía calostro

PROGRAMA DE VACUNACIÓN: Cerdas y primerizas preñadas.
En cerdas y primerizas que no han sido vacunadas previamente con **PORCILIS® PORCOLI DF**, deben ser vacunadas dos veces, con un intervalo entre ambas dosis de 4 semanas. La primera dosis debe ser administrada al menos 6 a 8 semanas antes de la fecha probable de parto.

RE-VACUNACIÓN: Una dosis única debe ser administrada durante la segunda mitad de la preñez, preferiblemente entre 2 y 4 semanas antes de la fecha prevista de parto. Generalmente esto significa cada 5 o 6 meses. Alternativamente, todo el grupo de reproductoras de un plantel pueden ser vacunadas una sola vez el mismo día, dos veces por año. En caso de introducción al plantel de animales de reemplazo no vacunados, éstos deben ser vacunados dos veces, con un intervalo de 6 semanas.

DOSIS Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN: Aplicar 2 ml por vía Intramuscular profunda en el cuello, detrás de la oreja.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en la oscuridad a una temperatura de 2 a 8°C. No congelar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Reacciones sistémicas moderadas y transitorias pueden ser observadas, pero solo en animales vacunados por primera vez.
Vacunar solamente animales sanos. Después de aplicada la vacuna se debe observar el animal por al menos 3 minutos para descartar cualquier reacción anafiláctica, lo cual es infrecuente.
Antes de usar permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C).
Agitar bien el frasco antes y durante la aplicación.
Los frascos abiertos deben ser usados en las próximas tres horas.
No mezclar con otras vacunas o sustancias.
Utilizar jeringas y agujas estériles. Evitar la introducción de contaminantes.

PRESENTACIÓN:
Frasco x 20 ml (10 dosis).

REGISTRO: 4A-10410-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: INTERVET INTERNATIONAL.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.
Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666