

PROLIF – L8



Bacterina contra la leptospirosis
Injectable



COMPOSICIÓN: Cada dosis bovina (3 ml) contiene una cantidad $\geq$ a 10^7 bacterias inactivadas de los siguientes serovares de *Leptospira*: *canicola*, *grippotyphosa*, *hardjo* (cepas *Hardjoprajitno* y *Hardjobovis*) *pomona*, *tarassovi*, *icterohaemorrhagiae* y *wolffi*.
Hidróxido de aluminio y excipientes, c.s.

INDICACIONES:

- **prolif-L8** está indicada para la prevención de la leptospirosis en bovinos, ovinos y porcinos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO BOVINOS: Aplicar 3 ml a partir de los 3 o 4 meses de edad. Cuando se administra por primera vez, se debe aplicar una segunda dosis a los 21 a 30 días.

Es aconsejable vacunar a las vacas y vaconas entre los 3 y los 6 meses de preñez.

Ovinos y porcinos: Aplicar una dosis de 2 ml. Revacunación anual o según criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea.

PRECAUCIONES: Conservar en refrigeración entre 2° y 8°C. No congelar.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 15 dosis bovinas.

REGISTRO: 4C-10445-AGROCALIDAD

DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.